

Spiraea alba (Tavolník bílý)

synonyma: *Eleiosina obovata*, *S. f. lanceolata*, *S. f. paniculata*, *S. var. alba*, *S. var. typica*, *Spiraea ciliata*, *Spiraea cuneifolia*, *Spiraea flexuosa*, *Spiraea lanceolata*, *Spiraea lancifolia*, *Spiraea latifolia*, *Spiraea paniculata*, *Spiraea salicifolia* var. *latifolia*, *Spiraea salicifolia* var. *linearis*, *Spiraea salicifolia* var. *paniculata*, *Spiraea undulata*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Alberta, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kentucky, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v Severní Americe v podobě široce vystoupavého 1/2-1/1kulatého hustého keře. Dorůstá výšky do 1,5 - 2m. Větve jsou hranaté a červeně hnědé. Listy jsou podlouhlé až obkopinaté, 1 - 2x pilovité, tuhé, dlouhé 3 - 7cm, spodní strana může být na žilkách ochlupená a řapíky dlouhé 3 - 5mm. Kvete bílými (i růžovými) květy o průměru 8mm v široce kuželovité latě délky i více než 20cm, vlastní květy mají kališní lístky 3úhlé, špičaté, korunní lístky jsou bílé, prakticky kulaté a dlouhé 2mm. Plodem je lesklý obkopinatý měchýřek délky 3,5mm a obsahuje úzce kopinatá semena délky 2mm.

<https://www.rostliny.net/>