

Spiraea media (Tavolník prostřední)

synonyma: *Spiraea argentea*, *Spiraea confusa*, *Spiraea daurica*, *Spiraea foliosa*, *S. f. oblongifolia*, *S. f. pilosiuscula*, *S. f. subintegerrima*, *S. subsp. media*, *S. var. mollis*, *S. var. monbetsuensis*, *S. var. oblongifolia*, *S. var. sericea*, *Spiraea mollis*, *Spiraea monbetsuensis*, *Spiraea oblongifolia*, *Spiraea pikoviensis*, *Spiraea sericea*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Česká republika, Čína, Japonsko, Korea, Mongolsko, Polsko, Sajany, Slovensko, Střední Asie, SV Evropa, Ukrajina, V Karpaty

Roste od střední Evropy po východní Asii v podobě široce vystoupavého 1/2 - 1/1kulatého hustého keře. Dorůstá výšky (0,5 -) 0,7 - 2m. Větve jsou obloukovité, okrové až hnědé a v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické, vejčité, obvejčité nebo prakticky kopinaté, v horní 1/3 zastříhovaně pilovité (i celokrajné), tmavě zelené, dlouhé 1 - 4,5 (i 5,5)cm, široké 0,7 - 1,5cm, báze klínovitá, spodní strana je světlejší, šedě zelená, méně ochlupená a řapíky jsou dlouhé 1 - 3 (i 4)mm. Květenstvím je okolíčnatý vrcholový 15 - 30tikvětý hrozen (i lata) délky 3 - 6cm, šířky 2 - 4cm, vlastní květy mají 0,6 - 1cm stopku, průměr 0,7 - 1cm, kališní lístky vejčité, dlouhé 1 - 2mm, korunní lístky jsou kulaté, bílé a průměru 2 - 3mm. Plodem je ochlupený měchýřek. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Blue Kazoo' - výška i šířka 60 - 90cm; listy sivě modré, později zeleně modré a načervenalé, nakonec prakticky zelené; velký kulovitý chocholík; do -40°C
- var. *glabrescens* - prakticky holý
- subsp. *media*/subsp. *oblongifolia* (Tavolník prostřední pravý) - květenství holé, korunní lístky bílé, celokrajné
- var. *mollis*/subsp. *polonica*/var. *mollis*/S. *polonica* - Polsko, Česko, Slovensko - listy oboustranně ochlupené; květenství ochlupené, korunní lístky nažloutlé, třásnité
- var. *sericea* - severovýchodní Asie; listy ochlupené až prakticky holé

Vyhovuje mu plné slunce a alespoň mírně vlhká půda.

Množí se řízkem.

<https://www.rostliny.net/>