

# Lindera aggregata

synonyma: *Cinnamomum aggregatum*, *Daphnidium strychnifolium*, *Laurus aggregata*

čeleď: Lauraceae

oblasti: Filipíny, Guangdong, Guangxi, Hainan, Vietnam

Roste v Číně, Filipínách a Vietnamu v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 5m. Borka je šedě hnědá. Větve jsou v mládí modře zelené, pruhované a ochlupené. Listy jsou střídavé, úzce vejčité až široce eliptické, prakticky zakulacené nebo kopinaté, zašpičatělé nebo ocasovité, kožovité, zelené, lesklé, dlouhé 2,7 - 6cm, široké 1,3 - 4cm, báze je zakulacená, žilnatina 3žilná a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Kvete po 6 - 8mi úžlabních okolících na krátkých větvích, listen má 7 květů, vlastní květy jsou 6tičetné, mají 0,4mm stopku, korunní lístky žluté nebo žlutě zelené (i prakticky bílé), samčí mají délku 4mm, šířku 2mm, samičí délku 2,5mm a šířku 2mm. Plody jsou vejčité (i prakticky kulaté), dlouhé 0,6 - 1cm a široké 4 - 7mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *aggregata*/*Benzoin strychnifolium*/*Daphnidium strychnifolium*/*Laurus aggregata*/L. *eberhardtii*/L. *strychnifolia* - Čína, Vietnam Filipíny; větve v mládí ochlupené; listy široce eliptické až prakticky kulaté, ocasovité
- var. *playfairii*/L. *alongensis*/L. *playfairii*/*Litsea playfairii*/*Neolisteia playfairii* - Guangdong, Guangxi, Hainan; listy úzce vejčité nebo kopinaté, ocasovité, dlouhé 4 - 6cm a široké 1,3 - 2cm

<https://www.rostliny.net/>