

Forestiera (Forestiéra)

čeleď: Oleaceae

Roste v Severní, střední a Jižní Americe v podobě opadavého (i stálezeleného) keře (i stromu). Dorůstá výšky 1 - 3m. Listy jsou jednoduché, vstřícné, malé, krátce řapíkaté a mohou být drobně pilovité. Kvete na loňských větvích drobnými dvoudomými nažloutlými květy bez koruny (max. s 1 - 2mi zakrnělými korunními lístky) v postranních svazečcích nebo hroznech, kalich má trubku krátkou se 4 - 6ti laloky. Plodem je černá peckovice obsahující 1 (i 2) semena.

Vyhovuje jí plné slunce a vlhká dobře propustná půda.

Množí se semeny nebo řízků.

Forestiera acuminata (Forestierovka špičatolistá)

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Tennessee, Texas

Roste v USA v podobě keře (i stromu). Dorůstá výšky 1,5 - 3m. Větve jsou šedé. Listy jsou úzce vejčité až kopinaté, zašpičatělé, v horní 1/2 mírně zubaté, zelené a dlouhé 3 - 10cm. Samčím květenstvím je přisedlý svazeček, vlastní květy jsou žlutě zelené, samičím květenstvím je hroznovitá lata. Plody jsou eliptické, růžově fialové a dlouhé 1,2cm.

Forestiera angustifolia

oblasti: Texas

Forestiera eggariana

oblasti: Portoriko

Forestiera godfreyi

oblasti: Florida, Georgia, Jižní Karolína

Forestiera hondurensis

Forestiera ligustrina

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Texas

Roste v USA v podobě keře. Dorůstá výšky do 2,5m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou úzce eliptické, tupé, pilovité, dlouhé 2 - 5cm a spodní strana je ochlupená. Samčím květenstvím je hustý přisedlý svazeček. Plodem je namodralá peckovice délky 8mm.

Forestiera neo-mexicana (Forestiérovká novomexická)

oblasti: Nové Mexiko

Roste v USA v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky 3m. Větve mohou být trnité a v mládí nažloutlé. Borka je hladká. Listy jsou vstřícné, obvejčité až obkopinaté nebo vejčitě kopinaté, mohou být drobně vroubkovaně pilovité, zelené, kožovité, dlouhé 1,5 - 5cm, široké 0,7 - 2cm a řapíky jsou dlouhé 0,2 - 1,1cm. Samičím květenstvím je úžlabní hrozen, vlastní květy jsou na 0,4 - 1cm stopce, drobné, žlutě bílé, samčím květenstvím je svazeček, vlastní květy jsou nažloutlé, bez koruny a kalich je 4zubý. Plodem je modře černá až černá mírně ojíněná eliptická peckovice.

Dobře snáší sucho.

Forestiera pubescens

oblasti: Arizona, Kalifornie, Kolorado, Nevada, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas, Utah

Forestiera reticulata

oblasti: Texas

Forestiera rhamnifolia

oblasti: Belize, Guatemala, Kuba, Mexiko, Portoriko

Roste v Karibiku, Mexiku, Belize a Guatemale v podobě dvoudomého stromu. Dorůstá výšky do 12m. Větve mohou být v mládí ochlupené. Listy jsou široce eliptické až úzce kopinaté, oboustranně stažené, tupě špičaté (i protáhlé), mohou být drobně řídce vroubkované, dlouhé 5 - 8cm, široké 2 - 5cm, báze je špičatá, spodní strana může být ochlupená a řapíky jsou krátké. Kvete jednopohlavnými drobnými květy v několikakvětých hroznech. Plodem je eliptická růžově fialová nasivělá tupá peckovice délky 8mm.

Forestiera segregata

oblasti: Florida, Georgia, Jamajka, Jižní Karolína, Kuba, Portoriko

Roste v Karibiku a USA v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 7m při průměru kmene do 15cm. Listy jsou podlouhlé, kopinaté nebo obvejčité, tupé nebo zašpičatělé, tuhé, lesklé, dlouhé 1,5 - 6cm, báze je zúžená, spodní strana světlá a řapíky krátké. Kvete drobnými žlutě zelenými květy. Plodem je podlouhlá až eliptická narůžověle fialová peckovice délky 0,6 - 1cm a obsahuje podélně žebrované pecky.

Forestiera shrevei

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nové Mexiko

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/domains/databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=310>

<https://www.rostliny.net/>