

Cedrela fissilis

synonyma: *Cedrela barbata*, *Cedrela brasiliensis*, *Cedrela brasiliensis* var. *australis*, *Cedrela brunellioides*, *Cedrela elliptica*, *C. var. glabrior*, *C. var. macrocarpa*, *Cedrela hirsuta*, *Cedrela longiflora*, *Cedrela macrocarpa*, *Cedrela pachyrhachis*, *Cedrela pilgeri*, *Cedrela regnellii*, *Cedrela tubiflora*, *Cedrela tubiflora* f. *angustifolia*, *Cedrela tubiflora* f. *grandifolia*, *Cedrela tubiflora* f. *parvifoliola*, *Cedrela tubiflora* f. *typica*, *Cedrela tubiflora* subsp. *bertoniensis*, *Cedrela tubiflora* subsp. *tubiflora*, *Cedrela tubiflora* var. *grandifolia*, *Cedrela tubiflora* var. *intermedia*, *Cedrela tubiflora* var. *lagenaria*, *Surenus fissilis*

čeleď: Meliaceae

oblasti: Argentina, Brazílie, J Mexiko, Karibik, Kostarika, Peru

Roste v pásu od Mexika po Argentinu v podobě stromu. Dorůstá výšky 15 - 18 (i 25)m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou dlouhé 28 - 50cm, tvořené 8 - 13ti páry (prakticky) vstřícných téměř přisedlých lístků, vřeteno s řapíkem je dlouhé 6,5cm, vlastní lístky jsou úzce kopinaté nebo úzce vejčité, zašpičatělé, prakticky kožovité, mírně lesklé, dlouhé 9 - 14cm, široké 2 - 3,7cm, báze je tupá nebo špičatá, spodní strana plstnatá a žilnatinu tvoří 18 střídavých žilek. Květenstvím je vrcholová drobně ochlupená lata, koncové větve jsou 1 - 3květé, vlastní květy jsou max. krátce stopkaté, kalich je vně ochlupený, má 5 špičatých zubů, korunní lístky jsou oboustranně plstnaté, podlouhlé, špičaté, dlouhé 8 - 9mm a široké 2mm. Plodem je úzce vejčité tobolky délky (3 -) 7 - 11cm a šířky (2 -) 3 - 5cm.

<https://www.rostliny.net/>