

Cycas bifida

synonyma: *Cycas longipetiolula*, *Cycas multifrondis*, *Cycas rumphii* var. *bifida*

čeleď: Cycadaceae

oblasti: Guangxi, Vietnam

Roste v Číně a Vietnamu. Kmínky bývají podzemní, dlouhé do 40cm, široké 10 - 30cm. Listy vyrůstají po 2 - 5ti, jsou lesklé, tmavězelené, dlouhé 2 - 5m, široké 80 - 90cm, zpeřené, tvořené 27 - 44 páry lístků, lístky tmavězelené, papírovité až kožovité, čárkovité, středové lístky dlouhé 30 - 60cm, široké 1,8 - 2,5cm, 1 - 3x dichotomicky větvené, řapíčky dlouhé 0,5 - 3,5cm, centrální žebro na horní straně vyniklé, okraj rovný, řapíky dlouhé 1,1 - 1,6m s 40 - 78mi páry trnů o délce 3 - 5mm a v rozteči 1,5 - 2,5cm. Samčí šištice dlouhé 20 - 25cm, široké 30 - 40cm, sporofyly dlouhé 19 - 23cm, hustě červenohnědě plstnaté, mají 6 - 8 vajíček, samčí šištice samostatné, vzpřímené, vřetenovité, válcovité, dlouhé 35 - 55cm, široké 6 - 8cm, bleděžlutě plstnaté s 2,5cm stopkami, sporofyly dlouhé 2 - 2,5cm.

<https://www.rostliny.net/>