

Cycas media (Cykas prostřední)

synonyma: *Cycas gracilis*, *Cycas gracilis* var. *glauca*, *Cycas gracilis* var. *viridis*, *Cycas kennedyana*, *C. f. inermis*, *C. var. inermis*, *Cycas megacarpa*, *Cycas normanbyana*, *Cycas rumphii* subsp. *normanbyana*

čeleď: Cycadaceae

oblasti: Queensland, Západní Austrálie

Roste v Austrálii. Kmínky jsou vzpřímené, obvykle nevětvené. Dorůstá výšky 1 - 5 (i 8)m při průměru kmene 20 - 30cm. Listy vyrůstají na vrcholku v počtu 10 - 30ks, jsou tmavězelené, dlouhé 0,7 - 1,8m, široké 20 - 26cm, mírně kýlnaté a obloukovité, zpeřené, tvořené 60 - 100 páry lístků, lístky mohou být srpovité, středové lístky dlouhé 13 - 25cm, široké 0,6 - 1cm, okraj může být mírně podvinutý, řapíky dlouhé 20cm, v mládí (na bázi trvale) hustě krátce červeně ochlupené a podle věku rostliny trnité. Samičí sporofyly dlouhé 20 - 40cm, jsou bledě žlutohnědé, hustě červenohnědě plstnaté, mají 4 - 10 vajíček, samčí šištice samostatné, vejčité až vejčitěválcovité, dlouhé 15 - 30cm, široké 8 - 15cm, oranžově plstnaté, stopky krátké, sporofyly klínovité a dlouhé 2,5 - 3,3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *banksii* - Queensland; listy dlouhé 1 - 2m, středové lístky dlouhé 13 - 24cm, široké 0,8 - 1cm

- var. *basaltica*/*C. basaltica* - Západní Austrálie; kmínky vzpřímené (i větvené), báze ztlustlá, průměr 15 - 19cm; výška do 1 (i 3)m; listy v počtu až 30ks, dlouhé 0,7 - 1m, široké 18 - 30cm, zpeřené, tvořené 70 - 105ti páry, lístky hustě stříbřitě plstnaté, směřují kupředu v úhlu 70 - 80°, tuhé, bazální redukované v trny, středové dlouhé 10 - 17cm, široké 1 - 2cm, celokrajné, mírně podvinuté, okraj ztlustlý, řapíky dlouhé 10 - 20cm, v mládí trnité; samičí sporofyly hustě rezavě ochlupené, samčí šištice samostatné, vzpřímené, úzce kuželovité, dlouhé 18 - 35cm, široké 7,5 - 8,8cm, stopky dlouhé 3cm, sporofyly dlouhé 2,5 - 3,5cm

- subsp. *ensata* - Queensland; listy dlouhé 1,4 - 2,3m, středové lístky dlouhé 13 - 24cm, široké 7 - 9mm

<https://www.rostliny.net/>