

Cycas ophiolitica

čeleď: Cycadaceae

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii. Kmínky jsou vzpřímené. Dorůstá výšky až 2 (i 4)m při průměru kmene 14 - 20cm. Listy mohou být mírně obloukovité a mírně kýlnaté, dlouhé 1 - 1,4m, široké 25 - 31cm, v mládí hustě šedě plstnaté, tmavězelené, zpeřené, tvořené 85 - 110 páry lístků, směřují kupředu pod úhlem 80 - 120°, na vrcholu jsou kratší, u báze se mírně zkracují, středové tuhé, zašpičatělé, dlouhé 14 - 24cm, široké 6 - 8mm, centrální žebro na horní straně mírně vystouplé, na spodní straně vyniklé, okraj může být mírně podvinutý, řapíky jsou dlouhé 18 - 36cm, v mládí trnité s trny délky 3 - 4mm a povrch bývá šedě až hnědě plstnatý. Samičí sporofyly dlouhé 18 - 30cm, hnědě plstnaté, s 2 - 6ti vajíčky, samčí šištice samostatné, dlouze vejčité, dlouhé 17cm, široké 8cm, rezavohnědě plstnaté, stopky krátké, sporofyly dlouhé 3,2 - 4cm.

<https://www.rostliny.net/>