

Cycas papuana (Cykas papuánský)

synonyma: *Cycas circinalis* subsp. *papuana*, *Cycas kennedyana*, *Cycas rumphii* f. *papuana*

čeleď: Cycadaceae

oblasti: Papua-Nová Guinea, Queensland

Roste na Papue Nové Guineji a v Austrálii. Kmínky jsou vzpřímené. Dorůstá výšky 2,5 - 4m při průměru kmene 15 - 20cm. Listy mohou být mírně klínovité, dlouhé do 1,5m, zakončené obvykle trnem, v mládí hustě bíle nebo oranžově plstnaté, zpeřené, tvořené lístky v 90 - 120ti párech, v mládí matně zelené, později až pololesklé, spodní strana bledší, směřují kupředu pod úhlem 45 - 70°, mírně srpovité, v rozteči 0,5 - 1,4cm, středové lístky jsou dlouhé 8 - 20cm, široké 0,5 - 1cm, centrální žebro z obou stran vystouplé, téměř stejně vyniklé, řapíky bývají holé, dlouhé 30 - 40cm a beztrnné. Samičí sporofyly dlouhé 16 - 20cm, jsou šedě a oranžově plstnaté, mají 2 - 6 vajíček, samčí šištice samostatné, vzpřímené, vejčité, dlouhé 15 - 20cm, široké 8 - 10cm, hustě oranžově až žlutě plstnaté, sporofyly dlouhé 2,4 - 3cm.

<https://www.rostliny.net/>