

Cycas pectinata (Cykas hřebenovitý)

synonyma: *Cycas circinalis* var. *pectinata*, *Cycas dilatata*, *Cycas jenkinsiana*, *Cycas wallichii*

čeleď: Cycadaceae

oblasti: Bangladéš, Bhútán, Kambodža, Laos, Nepál, Sikkim, Thajsko, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně, Bangladéši, Bhútánu, Kambodži, Sikkimu, Laosu, Nepálu, Thajsku a Vietnamu. Kmen bývá na vrcholku větvený, k bázi se zvětšuje. Dorůstá výšky 12 - 16m při průměru kmene až 0,6 (i 1)m. Borka je šedá, při bázi hladká. Listy vyrůstají na vrcholku po 30 - 40 (i 100)ks, jsou dlouhé 0,7 - 2,4m, široké 20 - 48cm, zpeřené, tvořené 50 - 100 páry lístků směřujících kupředu pod úhlem 45 - 60°, mírně srpovité, prohnuté do tvaru V, kožovité, spodní strana bledší, střední lístky dlouhé 18 - 32cm, široké 0,7 - 1,1cm, centrální žebro z obou stran vyniklé, celokrajné, konec pichlavý, řapíky při bázi zploštělé, dlouhé 10 - 35 (i 80)cm a mají 6 - 15 párů trnů. Samičí sporofyly dlouhé 22 - 30cm, hustě šedě až hnědě plstnaté, mají 2 - 4 vajíčka, samčí šištice samostatné, vzpřímené, vejčité, dlouhé 30 - 55cm, široké 16 - 22cm, žlutě až žlutooranžově plstnaté, stopky krátké, sporofyly dlouhé 4,3 - 6cm.

<https://www.rostliny.net/>