

Weigela middendorffiana (Weigelia Middendorffova)

synonyma: Calyptrostigma middendorffianum, Calyptrostigma middendorffianum, Diervilla middendorffiana, Macrodiervilla middendorffiana, Wagneria middendorffiana

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: Japonsko, JV Sibiř, Korea, S Čína, Sachalin, V Sibiř

Roste v Japonsku, Číně, Sachalinu, Kurilských ostrovech a Koreji v podobě asymetrického široce 1/2kulatého řídkého keře. Dorůstá výšky 1 - 1,5m. Borka je rýhovaná. Větve jsou šedé, v mládí hnědé až šedě žluté a ochlupené. Listy jsou max. krátce řapíkaté, eliptické, podlouhlé nebo vejčité kopinaté, špičaté, drobně pilovité, zelené, žilky zapuštěné, oboustranně ochlupené, dlouhé 5 - 8 (i 11)cm, široké 4 - 5cm, báze klínovitá (i zakulacená) a spodní strana je světlejší. Květenstvím je 1 - 3květý vrcholový svazeček, listence štětínovité nebo nitkovité, dlouhé 0,2 - 1cm, občas čárkovité, dlouhé do 2cm, vlastní květy mají 0,2 - 1,7cm stopku, kalich je 2pyský, trubka úzce eliptická, ochlupená, dlouhá 8mm, horní pysk má 3 zuby či laloky, spodní je hluboce 2pyský, koruna je žlutá, dlouhá 2,5 - 4,5cm a spodní cíp má oranžové skvrny. Plody jsou podlouhlé, eliptické nebo obvejčité, dlouhé 1,2 - 2,5cm, široké 3 - 7mm a obsahují zploštělá eliptická semena délky 4 - 5mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Hillier'/'Mango' - květy světle žluté, jícen oranžový, kresba zpravidla 3klaná až 3zubá

Vyhovuje jí vlhká slatinná půda.

<https://www.rostliny.net/>