

Sophora alopecuroides

synonyma: *Goebelia alopecuroides*, *Goebelia alopecuroides* var. *alopecuroides*, *Goebelia alopecuroides* var. *tomentosa*, *Pseudosophora alopecuroides*, *Radiusia alopecuroides*, *Sophora albescens*, *S.* subsp. *alopecuroides*, *S.* subsp. *jaubertii*, *S.* subsp. *prodanii*, *Sophora orientalis*, *Sophora pallida*, *Vexibia alopecuroides*, *Vexibia alopecuroides* subsp. *alopecuroides*, *Vexibiai alopecuroides*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Afganistán, Indie, Írán, Kazachstán, Pákistán, Xinjiang

Roste v Číně, střední a západní Asii, Indii, Afganistánu a Pákistánu v podobě hustě větvené ochlupené až plstnaté byliny nebo polokeře. Dorůstá výšky 1m. Palisty jsou šídlovité a dlouhé 5mm. Listy jsou zpeřené, dlouhé 15 - 30cm, široké 4 - 9cm, vlastní lístky jsou úzce kopinaté až úzce eliptické, oboustranně ochlupené a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květenstvím je vrcholový hustý hrozen, listeny se podobají palistům, vlastní květy mají 3 - 5mm stopku, kalich zvonkovitý, nestejně 5tízubý, zuby 3úhle vejčité, koruna bílá až bledě žlutá, pavéza zpravidla úzce obkopinatá, zakulacená nebo obsrdčitá, dlouhá 1,5 - 2mm, široká 3 - 4mm, křídla úzce vejčítá, dlouhá 1,6cm a člunek podlouhlý. Plodem je lusk délky 8 - 13cm obsahující mnoho vejčitých hnědých semen. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *alopecuroides*/*S. orientalis*/*S. pallida*/*Goebelia alopecuroides*/*Pseudosophora alopecuroides*/*Vexibia alopecuroides* - Čína, Indie, střední a jihozápadní Asie; větve ochlupené; lístky oboustranně ochlupené
- subsp. *tomentosa*/*Goebelia alopecuroides* var. *tomentosa*/*Vexibia alopecuroides* var. *tomentosa* - Xinjiang, Afganistán, Írán, Pákistán; větve i lístky plstnaté

<https://www.rostliny.net/>