

Calocedrus macrolepis

synonyma: Heyderia macrolepis, Libocedrus macrolepis, Thuja macrolepis

čeleď: Cupressaceae

oblasti: Indie, Laos, Myanmar (Barma), Tchaj-wan, Thajsko, Vietnam

Roste v Číně, Vietnamu, Laosu, Indii, Myanmaru, Tchaj-wanu a Thajsku v podobě kuželovitého, později kulovitého rozkladitého stromu. Dorůstá výšky 15 - 25 (i 35)m při průměru kmene do 1,5m. Borka je šedě hnědá, červeně hnědá nebo tmavě hnědá, v mládí hladká, později rýhovaná a odlupující se. Větve jsou rozkladité nebo vystoupavé. Listy jsou šupinaté, na hlavních větvích dlouhé do 1,2cm, na postranních dlouhé 6 - 8mm, široké 2,5mm a spodní strana je modro bílá. Samčí šištice jsou vejčité nebo podlouhlé, žluté, dlouhé 4 - 8mm, široké 2 - 3mm, samičí šištice jsou eliptické, červeně hnědé až fialově hnědé, dlouhé 1 - 2cm, široké 4 - 6mm, mají 6 šupin a fertilní obsahují obvejčité až eliptická mírně zploštělá semena délky 5 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. formosana/C. formosana/Heyderia formosana/Libocedrus formosana/Libocedrus macrolepis var. formosana - Tchaj-wan; borka hladká, růžově fialově červeně hnědá, větve se samičími šišticemi zploštělé, větvičky střídavé; listy šupinaté, tupé, široké 1,5 - 2,5cm; samičí šištice podlouhlé, mírně zahnuté, dlouhé 1 - 1,5cm, mají 4 šupiny, 2 postranní jsou fertilní, semena po 1 - 2ks, včetně křídla dlouhá 0,8 - 1,2cm

- var. macrolepis/Heyderia macrolepis/Libocedrus macrolepis/Thuja macrolepis - Čína, Indie, Laos, Myanmar, Thajsko, Vietnam; větvičky se samičími šišticemi kulaté nebo 4hranné

<https://www.rostliny.net/>