

Hibiscus diversifolius

synonyma: *Abelmoschus persicifolius*, *Althaea spicata*, *Furcaria diversifolia*, *Hibiscus beckleri*, *Hibiscus biflorus*, *H. subsp. diversifolius*, *H. var. diversifolius*, *Hibiscus paludosus*, *Hibiscus persicifolius*, *Hibiscus scaber*, *Hibiscus spicatus*

čeleď: Malvaceae

oblasti: Jižní Amerika, JV Afrika, JV Asie, Střední Amerika, V Afrika

Roste v tropické Africe a Asii, střední a Jižní Americe v podobě polokeře až keře (i šplhavého) (i stromu). Dorůstá výšky do 1 (i 10)m. Kmínky jsou ochlupené s ostny délky i více než 1mm. Borka je hnědě šedá. Větve jsou v mládí ochlupené a hustě ostnitě. Palisty jsou čárkovité, ochlupené a dlouhé 3 - 7mm. Listy jsou široce vejčité až prakticky kulaté, na vrcholu široce zúžený až zakulacené, asymetricky zubaté nebo zvoněné, dlouhé i široké do 16cm, žilnatinu tvoří 3 - 7 žilek a řapíky jsou dlouhé do 12 - 22cm. Kvete samostatnými žlutými úžlabními květy s růžově fialově hnědým středem, délky do 8cm, má 5 - 10 čárkovitých až šídlovitých zákrovních listenů délky 0,8 - 1,5cm, kalich je dlouhý 1,8 - 3cm, ochlupený, z 1/2 rozeklaný, laloky jsou špičaté až zašpičatělé, kopinaté, koruna je nálevkovitá, korunní lístky jsou obvejčité a dlouhé 3 - 6cm. Plodem je vejčitá ochlupená tobolka délky 2 - 2,4cm, šířky 1,5 - 1,9cm a obsahuje tmavě hnědá prakticky ledvinitá semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *diversifolius*/*H. berberidifolius*/*H. decaisneanus*/*H. diversifolius subsp. genuinus*/*H. diversifolius var. angustilobus*/*H. diversifolius var. witteanus*/*H. ficulneus*/*H. macularis*/*H.*

paludosus/*H. scaber* - kmínky řídké ochlupené; květy žluté s hnědým středem

- subsp. *rivularis*/*H. rivularis* - východní, jihovýchodní a jihozápadní Afrika; kmínky hustěji ochlupené; listy ochlupené; květe načervenalé až růžově fialové, střed tmavěji růžově fialový

<https://www.rostliny.net/>