

Aeschynanthus pulcher

synonyma: *Aeschynanthus beccarii*, *Aeschynanthus blumei*, *Aeschynanthus boschianus*, *Aeschynanthus javanicus*, *Aeschynanthus lamponga* var. *parvifolius*, *Aeschynanthus lampongus*, *Aeschynanthus lanceolatus*, *Aeschynanthus lobbianus*, *Aeschynanthus neesii*, *Aeschynanthus parvifolius*, *Aeschynanthus szcokhoffii*, *Aeschynanthus zollingeri*, *Trichosporum beccarii*, *Trichosporum boschianum*, *Trichosporum javanicum*, *Trichosporum lampongum*, *Trichosporum lobbianum*, *Trichosporum parvifolium*, *Trichosporum pulchrum*, *Trichosporum zollingeri*

čeleď: Gesneriaceae

oblasti: Borneo, Jáva, Malajsie, Malajský poloostrov, Malé Sundy, Sumatra, Thajsko, Vietnam

Roste na Javě, Borneu, Malých Sundách, Sumatře, Thajsku a Malajsii jako šplhající nebo plazivý epifyt. Dorůstá délky až 3m. Stonky jsou převislé. Listy jsou tlusté a vejčité a na okraji nafialovělé. Květy jsou převislé, červené až oranžové, ostře ochlupené, dlouhé 5cm, kalich je dlouhý, zpravidla tmavší a má široce laločnatou korunu.

<https://www.rostliny.net/>