

Solanum pseudocapsicum (Lilek višňový)

synonyma: Brachistus grisebachii, Solanum capsicastrum, Solanum capsicastrum var. caaguazuense, Solanum capsicastrum var. capsicastrum, Solanum compactum, Solanum diffusum, Solanum diffusum subsp. diffusum, Solanum diffusum var. diffusum, Solanum diflorum, Solanum diflorum var. angustifolium, Solanum diflorum var. diflorum, Solanum diflorum var. hyrophilum, Solanum diflorum var. pulverulentum, Solanum diphylum, Solanum diphylum var. diphylum, Solanum diphylum var. pulverulentum, Solanum dunnianum, Solanum eremanthum, Solanum hendersonii, Solanum hermannioides, Solanum hyemale, Solanum hyrophilum, Solanum ipecacuanha, Solanum ipecacuanha var. calvescens, Solanum ipecacuanha var. ipecacuanha, Solanum ipecacuanha var. obovata, Solanum jaliscanum, Solanum karstenii, Solanum linkianum, Solanum lucidum, Solanum mexiae, Solanum microcarpum, Solanum montevidense, Solanum pavimenti, Solanum pilosulum, Solanum pilosum, Solanum pilosulum, Solanum plurifurcipilum, S. f. calvescens, S. f. microcarpum, S. f. pilosulum, S. f. pilosum, S. f. pilosulum, S. f. pseudocapsicum, S. subsp. diflorum, S. subsp. pseudocapsicum, S. var. ambiguum, S. var. diflorum, S. var. hyrophilum, S. var. lancifolium, S. var. luteum, S. var. microcarpum, S. var. normale, S. var. parvifolium, S. var. pseudocapsicum, S. var. sendtnerianum, S. var. typicum, Solanum singuliflorum, Solanum tucumanense, Solanum ulmoides, Solanum uniflorum, Solanum validum

čeleď: Solanaceae

oblasti: Alabama, Brazílie, Connecticut, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Írán, Jižní Karolína, Louisiana, Massachusetts, Mississippi, New York, Texas

Pochází z Brazílie. Podobná druhu *S. capsicastrum*, ale má větší plody. Povrch je lysý. Dorůstá výšky 20 - 50cm. Listy jsou úzce kopinaté až úzce obkopinaté, dlouhé 3 - 6cm a široké 1 - 1,5cm. Kvete bílými květy o průměru 1 - 1,5cm. Plodem je kulovitá bobule v barvách žluté, oranžové nebo červené.

Vyhovuje mu rozptýlené plné slunce. Teplota by se měla pohybovat v rozmezí 15 - 18°C, na zimu na stinnějším místě až k 10°C. Jako substrát se používá běžný pokojový s přídavkem rašeliny a potřebná je dobrá drenáž. V době vegetace se hnojí 1x za 14 dní. Přesazuje se, až když kořeny vyplní květináč. Rozvětvení dosáhněte tak, že budete stonky zaštípat.

Množí se vrcholovými řízky s patkou nebo semeny.

<https://www.rostliny.net/>