

Solanum bahamense (Lilek bahamský)

synonyma: *Solanum anacanthum*, *S. var. lanceolatum*, *S. var. luxurians*, *S. var. rugelii*, *S. var. subarmatum*, *Solanum cestrophyllum*, *Solanum fruticosum*, *Solanum igneum*, *Solanum igneum var. igneum*, *Solanum igneum var. inerme*, *Solanum igneum var. parvifolium*, *Solanum lanceifolium*, *Solanum molle*, *Solanum parvifolium*, *Solanum persicifolium*, *Solanum persicifolium var. angustifolium*, *Solanum persicifolium var. belloi*, *Solanum persicifolium var. parvifolium*, *Solanum persicifolium var. persicifolium*, *Solanum racemosum*, *Solanum racemosum var. igneum*, *Solanum racemosum var. racemosum*, *Solanum ramosum*, *Solanum subarmatum*, *Solanum torvum var. persicifolium*, *Solanum umbrosum*, *Solanum varginisticum*

čeleď: Solanaceae

oblasti: Florida, Hispaniola, Jamajka, Kuba, Portoriko

Roste na Bahamách, Kubě, Hispaniole, Jamajce a USA v podobě keře. Dorůstá výšky do 2m. Může být ostnité. Listy jsou podlouhlé až kopinaté, špičaté nebo tupé, mohou být mírně zvlněné, dlouhé 4 - 12cm, báze je zúžená až tupá a řapíky jsou tenké. Květenství je hroznovité, stopkaté, vlastní květy mají 0,6 - 1,2cm stopku, za plodu převalou, kalich má velikost 1,5mm, laloky jsou vejčité, koruna modrá (i bílá) a široká 1 - 1,5cm. Plodem je červená kulovitá bobule o průměru 6 - 8mm.

<https://www.rostliny.net/>