

Vitis vinifera (Réva vinná)

synonyma: Cissus vinifera, Vitis sylvestris, V. subsp. sativa, V. subsp. sylvestris

čeleď: Vitaceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Černé moře, Česká republika, Florida, Francie, Gruzie, Idaho, Írán, Itálie, Izrael, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libye, Maďarsko, Makedonie, Maroko, Massachusetts, Moldávie, Německo, New York, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portoriko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Střední Asie, Sýrie, Švýcarsko, Texas, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Utah, Virginie, Washington

Patří mezi jednodomé rostliny. Volně dokáže dorůst délky 2 - 30m díky úponkům. Listy mají dlانitý 2 - 5x laločnatý tvar s výrazným pilovitým okrajem a spodní strana je ochlupená až vločkovitá. Na nových výhonech se nechávají 2 - 3 očka. Kvete bílými květy na 2 roky starém výhonu. Plodem jsou bobule kulatého až eliptického tvaru seskupené hroznu, jsou zelené, žluté, načervenalé nebo modrofialové a dlouhé 0,6 - 2,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'André' - velmi pozdní
- subsp. anebophylla
- 'Arkadia' - rané
- 'Bianca' - bílé hrozny
- 'Boskoop Glory'
- 'Cabernet Sauvignon'
- 'Diamant'
- 'Frankovka' - velmi pozdní
- 'Chrupka bílá' - pozdní
- 'Chrupka červená'
- 'Irsai Oliver' - velmi rané
- 'Isabela' - tmavě modré hrozny
- 'Julski Biser' - rané
- 'Jupiter' - pozdní
- 'Kardinál'
- 'Müller-Thurgau' - středně rané
- var. multiloba
- 'Nero'
- var. palmata
- 'Panonia Kincse' - středně rané
- 'Portugalské modré'
- 'Prim' - rané
- 'Purpurea'
- 'Ryzlink rýnský' - velmi pozdní
- 'Ryzlink vlašský' - velmi pozdní
- subsp. sativa
- 'Sauvignon'
- 'Shiva Grossa'/'Black Hamburg' - nejstarší plodící exemplář se nachází v zámeckých zahradách Hampton Court
- 'Sieger' - velmi rané
- 'Solaris'
- 'Sylvánské zelené'
- subsp. sylvestris (Réva vinná lesní) - dvoudomá; listy s výrazným zářezem na bázi; plody o průměru 0,6 - 1cm; chráněný druh C1

- 'Tramín červený'
- subsp. trichophylla
- 'Veltlínské červené rané' - středně rané
- subsp. vinifera (Réva vinná pravá) - pochází asi ze středoze­mí, blízkého východu a střední Asie; jednodomá; listy s úzkým zářezem na bázi; plody o průměru 1,2 - 2cm

Vyhovují jí slunné stráně, zemina bohatá na živiny, pokud možno co nejhlouběji z­kypřená a odvodněná. Je mrazuvzdorná do -24°C. Každým rokem se musí seřezávat.

Množí se řízký na přelomu února a března, kdy se provádí i seřezávání výhonů.

<https://www.rostliny.net/>