

Agave striata

synonyma: *Agave echinoides*, *Agave ensiformis*, *Agave hystrix*, *Agave recurva*, *Agave richardsii*, *A. f. recurva*, *A. var. echinoides*, *A. var. mesae*, *A. var. recurva*, *Bonaparteia hystrix*

čeleď: Agavaceae

oblasti: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas

Roste v Mexiku v trsech. Růžice dorůstá výšky 0,5 - 1m a šířky 0,5 - 1,2m. Listy jsou na horní straně vypouklé, šedě zelené, tmavě zeleně pruhované, dlouhé do 45 (i 60)cm, široké 1cm, okraj drobně ostnitý, vrcholový ostěn je červeně hnědý až tmavě šedý a dlouhý 1 - 5cm. Květenství má stvol výšky 2 - 2,5m, je vzpřímené, klasnaté, řídké, vlastní květy žluté až žlutě zelené, někdy červeně růžově fialové, dlouhé do 4cm. Plodem je válcovitá tobolka obsahující černá zploštělá semena délky 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Dwarf' - hustý zakrslý habitus
- subsp. *falcata*/*A. falcata* - Coahuila, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango; růžice řidší; listy široké 0,6 - 2cm
- 'Nana' - zakrslý habitus; listy malé, šedé

Je mrazuvzdorná až do -13°C.

Množí se odnožemi nebo semeny.

<https://www.rostliny.net/>