

Tillandsia cyanea (Kykatka namodralá)

synonyma: Phytarrhiza lindenii, Platystachys cyanea, Tillandsia coerulea, T. var. tricolor, Tillandsia lindenii, Tillandsia lindenii var. rosea, Tillandsia lindenii var. rutilans, Tillandsia lindenii var. superba, Tillandsia lindenii var. tricolor, Tillandsia lindenii var. vera, Tillandsia lindenii var. violacea, Tillandsia morreniana, Vriesea lindenii, Wallisia lindenii

čeled': Bromeliaceae

oblasti: Ekvádor

Pochází z Ekvádoru. Patří mezi epifyty, jako ostatní kykatky. Vytváří centrální růžici z tenkých listů se stříbřitými šupinkami. Starší rostliny nemají kořínky. Ty mají pouze mladé rostlinky, které se vytvářejí jako náhrada za rodičovskou vykvetlou rostlinu, která poté odumírá. Kvete růžovofialovými nebo bílými květy ve věku zhruba 2 let. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. cyanea
- 'Pink Quill'
- var. tricolor

Rostlinám vyhovuje rozptýlené světlo a vysokou vzdušnou vlhkost, min. 60%. Minimální teplota je v zimě 15°C, v létě kolem 25°C. Zálivka se provádí do středu růžice. V substrátu se prakticky jenom drží a vodu z něj neodebírání.

Množí se semeny nebo dceřinnými rozetkami, které se nechají v písčitém substrátu do doby, než se vytratí kořínky a pak se mohou uchytit v jakémkoliv zemině.

<https://www.rostliny.net/>