

Chamaedorea adscendens

synonyma: *Kinetostigma adscendens*, *Tuerckheimia adscendens*, *Tuerckheimia ascendens*

čeleď: Arecaceae

oblasti: Belize, Guatemala

Roste v Belize a Guatemale. Kmen je jednoduchý, dlouhý do 2,5m (někdy i téměř bezkmenný) a široký pouze 1cm. Listy vyrůstají po 5 - 7mi ks, jsou matné, zelené, řapíky dlouhé 7cm, bývají zpeřené (někdy pouze 2klané) tvořené 1 - 6ti páry, lístky dlouhé do 16cm, široké 2,5cm, obvejčitě kopinaté, matné, zelené, sametové, tlusté, kožovité, terminální bývají širší. Samčí květenství štíhlé, dlouhé do 40cm, vřeteno krátké, větví 2 - 10, převislé, květy béžové, dlouhé 2,5mm, kalich světlý, mělce 3laločný; samičí klasnaté, dlouze stopkaté, vzpřímené, dlouhé 10cm, kalich dlouhý 1mm, korunní lístky krátce srostlé. Plody jsou kulovité až vejčité, černé, široké do 8mm, korunní lístky vytrvávající a semena jsou dlouhá 6mm.

Roste nejraději na vápencových podkladech.

<https://www.rostliny.net/>