

Chamaedorea cataractarum

synonyma: Chamaedorea atrovirens, Chamaedorea flexuosa, Chamaedorea lindeniana, Chamaedorea martiana, Nunnezharia cataractarum, Nunnezharia flexuosa, Nunnezharia martiana, Stachyophorbe cataractarum, Stephanostachys martiana, Vadia jotolana

čeleď: Arecaceae

oblasti: J Mexiko

Roste v Mexiku v trsech. Kmínky se větví už od báze, jsou poléhavé, celkově zabírají výšku 1,8m, šířku 3m. Listy vyrůstají po 4 - 5ti ks, jsou dlouhé 1,2m, zpeřené, tvořené 13 - 20 páry lístků, lístky čárkovitě kopinaté, dlouhé do 30cm, široké 2,5cm, horní strana lesklá, tmavězelená, centrální žebro a řapíky světlé. Květenství má 6 - 15 větví, délku 45cm, objevuje se při bázi, vlastní květy jsou drobné a žluté. Plody jsou vejčitě podlouhlé, černé až načervenalé, dlouhé do 1cm a široké 6 - 8mm.

Roste podél okrajů řek a potoků a snáší i časté zaplavení proudící vodou - takové druhy označujeme jako reofyty. Dobře se mu proto daří přímo u vodopádu na plném slunci s vysokou vzdušnou vlhkostí.

<https://www.rostliny.net/>