

Chamaedorea costaricana

synonyma: *Chamaedorea biolleyi*, *Chamaedorea inaequilateralis*, *Chamaedorea linearia*, *Chamaedorea quezalteca*, *Chamaedorea seibertii*, *Legnea laciniata*, *Nunnezharia costaricana*, *Omanthe costaricana*

čeleď: *Arecaceae*

oblasti: Guatemala, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Panama, Salvador

Roste v Mexiku, Kostarice, Salvadoru, Guatemale, Hondurasu, Nikarague a Panamě v trsech. Kmeny jsou tmavě zelené, kroužky bledě zelené, vysoké (1 -) 3 - 8m, široké 1 - 6cm a trsy jsou celkově široké 2,4 - 3m. Listy vyrůstají po 3 - 6ti ks, dlouhé 1,2m, obloukovité, řapíky dlouhé 60cm, zpeřené, tvořené 15 - 30ti páry lístků, lístky kopinaté, dlouhé 25 - 40cm, široké 2 - 5cm, olivové a tmavě zelené, tenké, žilnatina má 1 primární a 2 sekundární oboustranné žilky. Květenství je vzpřímené až převislé, tvořené 6 - 30ti větvemi, vlastní květy žluté až bledě oranžové a jednopohlavné. Plody kulovité či eliptické, černé, dlouhé 1,2 - 1,3cm a široké 0,7 - 1cm.

<https://www.rostliny.net/>