

Chamaedorea elatior

synonyma: *Anothea scandens*, *Chamaedorea affinis*, *Chamaedorea bambusoides*, *Chamaedorea bambusoides* var. *graminifolia*, *Chamaedorea bambusoides* var. *juncea*, *Chamaedorea desmoncoides*, *C.* var. *bambusoides*, *C.* var. *desmoncoides*, *Chamaedorea montana*, *Chamaedorea regia*, *Chamaedorea repens*, *Chamaedorea resimpia*, *Chamaedorea resinifera*, *Chamaedorea robusta*, *Chamaedorea scandens*, *Chamaedorea scandens* var. *bambusoides*, *Chamaedorea scandens* var. *desmoncoides*, *Nunnezharia affinis*, *Nunnezharia desmoncoides*, *Nunnezharia elatior*, *Nunnezharia oaxacensis*, *Nunnezharia regia*, *Nunnezharia repens*, *Nunnezharia resinifera*, *Nunnezharia robusta*, *Platythea graminea*

čeleď: Arecaceae

oblasti: Guatemala, Honduras, Mexiko

Roste v Mexiku, Guatemale a Hondurasu, občas v trsech a vzhled je rákosovitý. Dorůstá výšky do 4 (i 20)m při průměru kmene 2cm, může být mírně popínavý, v mládí téměř vzpřímený. Listy vyrůstají po 5 - 15ti ks, mají dlouhé trubkovité pochvy pokrývající obvykle až 2 uzliny, jsou dlouhé do 30cm, listy dlouhé do 3m, řapíky krátké, zpeřené (i 2klané), tvořené 10 - 55 páry lístků, lístky dlouhé 45cm, široké 3cm, někdy zakřivené, středové dlouhé 45cm, široké 3cm. Květenství je vzpřímené, má až 35 větví, podepřené 3 - 4mi toulci, samčí dlouhé i široké 20cm nebo i více, větve bohaté, samičí je dlouhé i široké 40cm, větvené s větvemi o délce až 30cm, barvy oranžové až růžovočervené, za plodu matně hnědé, kalich hluboce laločnatý. Plody jsou kulovité, černé, modře ožíněné a široké 0,8 - 1,1cm.

<https://www.rostliny.net/>