

Schefflera actinophylla

synonyma: *Aralia longipes*, *Brassaia actinophylla*, *Brassaia singaporensis*

čeleď: Araliaceae

oblasti: Florida, Havajské ostrovy, Jáva, Nová Guinea, Portoriko, Queensland, Severní teritorium

Pochází z Austrálie, Nové Guineje a Jávy. Roste stálezelené rostliny. Dospělá rostlina v teplém teplotním pásmu dorůstá velikosti stromu vysokého 2 - 10 (i 30)m. S rostoucím věkem nabývá kromě velikosti i na počtu lístků celého listu ze 4 na 12. Listy jako takové jsou seskupené v terminálních růžicích, mají až 80cm řapíky, lístky jsou dlouhé do 30cm, široké 10cm, celokrajné, zelené, lesklé, tupé (u mladých exemplářů špičaté). Květenství je terminální, latnaté, 2x složené, dlouhé údajně až 2m, hlavní větve jsou po 6 - 13ti ks, mají délku do 80cm, jsou růžovofialovočervené, paprscité, vlastní květy jsou růžové až červené seskupené ještě do krátce stopkatých hlávek a ty jsou ještě seskupené do hroznů. Celkově dávají základ k lidovému pojmenování: Chobotnicový strom.

Daří se jí při osvětlení v rozmezí 600 - 800luxů což odpovídá jasně osvětlenému místu bez přímého slunce. Teplotně vyhovuje rozmezí 14 - 18°C, v zimě 12 - 16°C. Od jara do podzimu zaléváme vydatně, na zimu zálivku zmírníme. Důležité je také časté rosení listů, abychom dosáhly vyšší hladiny vlhkosti vzduchu. Kromě vlhké půdy vyžaduje také zeminu bohatou na zeminu. Přesazujeme ji každý rok v období jara. Množení je obtížné. Můžete ale zkusit stonkové řízky se stimulátorem v období léta a zakořenit s přístupem spodního tepla.

I jako jiné šeflery dokáže vyklíčit na jiném stromě a kořeny pak spustit dolů k zemi.

<https://www.rostliny.net/>