

Chamaedorea pauciflora

synonyma: Chamaedorea amazonica, Chamaedorea integrifolia, Chamaedorea lechleriana, Morenia integrifolia, Morenia integrifolia var. nigricans, Morenia lechleriana, Morenia pauciflora, Nunnezharia amazonica, Nunnezharia integrifolia, Nunnezharia pauciflora

čeleď: Arecaceae

oblasti: Amazonas, Ekvádor, Kolumbie, Peru

Roste v amazonii, Kolumbii, Ekvádoru a Peru. Kmeny jsou vzpřímené, dlouhé 0,3 - 2m a široké 1 - 2cm. Listy vyrůstají po 4 - 9ti ks, jsou jednoduché i zpeřené, jednoduché jsou 2klané, dlouhé do 75cm, široké 40cm, zpeřené tvoří 4 - 7 párů čárkovitých esovitých lístků, postranní jsou 3žilné, terminální 4 - 6tižilné, řapíky dlouhé 20cm a vřeteno dlouhé 45cm. Květenství je 2tvárné, samčí klasnaté, seskupené po 7mi ks; samičí klasnaté, samostatné, dlouhé 30cm, vřeteno dlouhé 30 - 50cm, kalich vejčitý, laloky vejčité, špičaté a semeníky téměř kulovité. Plody jsou eliptické, černé, dlouhé 1,2 - 1,5cm a široké 5 - 8mm.

<https://www.rostliny.net/>