

Chamaedorea pinnatifrons

synonyma: *Borassus pinnatifrons*, *Chamaedorea aguilariana*, *Chamaedorea bartlingiana*, *Chamaedorea bifurcata*, *Chamaedorea boliviensis*, *Chamaedorea bracteata*, *Chamaedorea brevifrons*, *Chamaedorea concinna*, *Chamaedorea concolor*, *Chamaedorea conocarpa*, *Chamaedorea depauperata*, *Chamaedorea dryanderæ*, *Chamaedorea flavovirens*, *Chamaedorea geonomoides*, *Chamaedorea gracilis*, *Chamaedorea heilbornii*, *Chamaedorea herrerae*, *Chamaedorea holmgrenii*, *Chamaedorea hoppii*, *Chamaedorea kalbreyeriana*, *Chamaedorea lanceolata*, *Chamaedorea lanceolata* var. *littoralis*, *Chamaedorea macroloba*, *Chamaedorea membranacea*, *Chamaedorea micrantha*, *Chamaedorea minor*, *Chamaedorea oerstedii*, *Chamaedorea pacaya*, *Chamaedorea rhombea*, *Docanthe alba*, *Hyospathe montana*, *Martinezia lanceolata*, *Nunnezharia bartlingiana*, *Nunnezharia bifurcata*, *Nunnezharia bracteata*, *Nunnezharia brevifrons*, *Nunnezharia concolor*, *Nunnezharia conocarpa*, *Nunnezharia flavovirens*, *Nunnezharia geonomoides*, *Nunnezharia lanceolata*, *Nunnezharia membranacea*, *Nunnezharia pacaya*, *Nunnezharia pinnatifrons*

čeleď: *Arecaceae*

oblasti: Belize, Guatemala, Honduras, Kostarika, Nikaragua, Panama

Roste ve střední Americe. Kmen bývá vzpřímený, má výšku 0,5 - 4,5m a šířku 0,5 - 3cm. Listy vyrůstají po 3 - 10ti ks, jsou zpeřené (i jednoduché), tvořené 2 - 8mi páry lístků, lístky dlouhé 11 - 40cm, široké 2 - 15cm, jednoduché mají 10 párů žilek. Květenství je vzpřímené až vodorovné, samčí i samičí podobné, mají 2 - 45 větví. Plody jsou kulovité až eliptické (i srpovité), zelené až oranžové či červené, později černé, dlouhé 0,5 - 1,5cm a široké 4 - 5mm.

<https://www.rostliny.net/>