

Chamaedorea tepejilote

synonyma: Chamaedorea anomospadix, Chamaedorea casperiana, Chamaedorea columbica, Chamaedorea exorrhiza, Chamaedorea sphaerocarpa, Chamaedorea wendlandiana, Edanthe veraepacis, Nunnezharia casperiana, Nunnezharia tepejilote, Nunnezharia wendlandiana, Stephanostachys casperiana, Stephanostachys tepejilote, Stephanostachys wendlandiana

čeleď: Arecaceae

oblasti: J Mexiko, Kolumbie, Střední Amerika

Roste od Mexika po Kolumbii. Občas roste v trsech. Kmen je vzpřímený (i plazivý) a dorůstá výšky 2 - 7m při průměru 2 - 10cm. Přírůstky jsou dlouhé 4,5 - 6,5cm. Listy vyrůstají po 3 - 7ks, mají válcovité pruhovaně žilkované pochvy, řapíky silné, dlouhé 10 - 47cm, včetně dlouhé 6 - 14cm, čepel zpeřená, tvořená 6 - 25ti páry lístků, lístky téměř vstřícné, dlouhé 16 - 70cm, široké 3,5 - 10cm, mají 5 (i 8) primárních žilek, na horní straně kýlnaté, na spodní nažloutlé, mají 4 - 5 či více sekundárních žilek. Květenství se objevuje pod list, je samostatné, podepřené 4 - 5ti toulci, samčí má 6 - 17cm stopky, 7 - 50 větví délky 7 - 15cm, osa dlouhá 6 - 22cm, květy žluté, kalich krátký, dlouhý 0,3mm, korunních lístky dlouhé 2,5mm; samičí má 5 - 20 větví délky 3 - 30cm, stopky dlouhé 10 - 27cm, kalich dlouhý 0,5 - 1mm, korunní lístky široce vejčité. Plody jsou eliptické až vejčité, černé dlouhé 1 - 2cm a široké 7 - 8mm. Její indiánské jméno je Pacaya a nerozvinutá samčí květenství se sklizejí a pojídají, trochu jako mladé kukuřičky.

<https://www.rostliny.net/>