

Veronica hederifolia (Rozrazil břechťanolistý)

synonyma: *Cardia quadriloba*, *Cochlidiosperma hederifolium*, *Cochlidiosperma lappago*, *Pocilla hederifolia*, *Veronica cymbalarifolia*, *V. var. agrestis*, *Veronica lappago*, *Veronica simplex*, *Veronica sublobata*

čeleď: Scrophulariaceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arkansas, Arménie, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Česká republika, Delaware, Estonsko, Florida, Francie, Georgia, Illinois, Indiana, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Jordánsko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kazachstán, Kentucky, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Libanon, Libye, Litva, Lotyšsko, Louisiana, Lucembursko, Maďarsko, Makaronésie, Maroko, Maryland, Mississippi, Missouri, Moldávie, Nebraska, Německo, New Jersey, New York, Nizozemí, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Severní Karolína, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Utah, Velká Británie, Virginie, Washington, Západní Virginie

Dorůstá výšky 5 - 35 (i 60)cm. Patří mezi jednoletky. Stonek má poléhavý nebo vystoupavý. Jak název napovídá, listy trochu připomínají břechťan, jsou ochlupené, mají stejnou šířku i délku a (3 -) 5 (i 7) drobných laloků. Květenství je 5 - 30tičetné, kvete drobnými modrými kvítky o průměru (2 -) 4 - 7 (i 9)mm se 4mi okvětními lístky. Plodem je kulovitá tobolka obsahující 4 prakticky kulatá semena s prohlubní uprostřed. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *hederifolia* (Rozrazil břechťanolistý pravý)
- subsp. *lucorum*
- subsp. *sibthorpioides*
- subsp. *triloba*

Potřebuje plné světlo a suché nebo mírně vlhké stanoviště. Na zahrádkách roste jako plevel.

Množí se semeny, které často rozšiřují mravenci.

<https://www.rostliny.net/>