

Veronica scutellata (Rozrazil štítkovitý)

synonyma: *Cardia scutellata*, *Limnaspidium parmularium*, *Limnaspidium scutellatum*, *Veronica connata*, *Veronica parmularia*, *Veronica polozhiaie*, *V. f. alba*, *V. f. scutellata*, *V. var. glabra*, *V. var. longibracteata*, *V. var. pilosa*, *V. var. scutellata*, *Veronica uliginosa*

čeleď: Scrophulariaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Austrálie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Irsko, Itálie, Jižní Amerika, Kalifornie, Katalánsko, Kolorado, Labrador, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nový Zéland, Nunavut, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Slovensko, Střední Sibiř, Švýcarsko, Tennessee, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Z Sibiř, Západní Virginie

Roste jako trvalka v celé Evropě kromě jihu a přesahuje až do střední Sibiře, zavlečený byl do Severní a Jižní Ameriky, Austrálie a na Nový Zéland. Dorůstá výšky až 10cm. Lodyha je zpravidla nevětvená, může být až poléhavá, 4hranná a dlouhá do 50cm. Listy jsou vstřícné, úzce kopinaté, tupě pilovité a mohou být tmavěčervené. Květenství je řídké, květy jsou bílé až bleděfialové, žilnatina načervenalá a v průměru mají 3 - 4mm. Plodem je zploštělá eliptická tobolka.

Vyhovují jí vlhká místa i rašeliny, rákosiny, příkopy, atp.

<https://www.rostliny.net/>