

Veronica serpyllifolia (Rozrazil douškolistý)

synonyma: Cardia multiflora, Cardia officinalis, Veronica alpestris, Veronica bolivari, Veronica borealis, Veronica bungabecca, Veronica capensis, Veronica funesta, Veronica humifusa, Veronica integerrima, Veronica microphylla, Veronica neglecta, Veronica nummulariifolia, Veronica riederana, Veronica riederiana, Veronica ruderalis, Veronica rugulosella, V. subsp. humifusa, V. subsp. neomexicana, V. subsp. nummularioides, V. subsp. serpyllifolia, V. subsp. trichocaulis, V. var. alpestris, V. var. nummularioides, V. var. serpyllifolia, Veronica tenella, Veronica villosiuscula, Veronica wolffiana, Veronicastrum serpyllifolium

čeleď: Scrophulariaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Altaj, Andalusie, Arizona, Arkansas, Austrálie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Grónsko, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, J Afrika, Jižní Amerika, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kavkaz, Kentucky, Kolorado, Labrador, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nový Zéland, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Skandinávie, Švýcarsko, Tennessee, Ural, Utah, V Asie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Roste v Evropě a dále až po Dálný východ, zavlečený byl do Severní a Jižní Ameriky, jižní Afriky, Austrálie a Nového Zélandu. Dorůstá výšky (3-) 8 - 30 (i 40)cm. Patří mezi trvalky. Pod zemí vytváří bledý bylinný oddenek. Lodyha je na bázi dlouze vystoupavá, max. chudě větvená a ochlupená. Listy jsou krátce řapíkaté, vstřícné, vejčité až eliptické, přisedlé nebo krátce řapíkaté, dlouhé (0,2-) 0,8 - 2 (i 3)cm, široké (0,2-) 0,5 - 1,3 (i 1,8)cm, jsou výrazně prohnuté a v průřezu vytvářejí tvar písmena V. Kvete bílými květy s modrofialovým středem v (5-) 10 - 40tičetném hroznu, kališní cípy jsou 4ks, úzce eliptické až vejčité a koruna je bělavá až nafialovělá s průměrem 0,5 - 0,9 (i 1,2)cm. Plodem je ledvinovitá na okraji žláznatě ochlupená tobolka délky 2,5 - 3,5mm, šířky 4 - 6mm a obsahuje 20 - 60 semen. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. humifusa
- subsp. serpyllifolia (Rozrazil douškolistý pravý)

Vyskytuje se na volném prostředí, loukách, mezích, okrajích cest a lesů. Má ráda vlhké půdy.

<https://www.rostliny.net/>