

Veronica spuria (Rozrazil latnatý)

synonyma: *Ponaria laciniata*, *Pseudolysimachion paniculatum*, *Pseudolysimachion paniculatum* subsp. *foliosum*, *Pseudolysimachion spurium*, *Pseudolysimachion spurium* subsp. *foliosum*, *Pseudolysimachion spurium* subsp. *paniculatum*, *Veronica amethystina*, *Veronica brevifolia*, *Veronica capitulata*, *Veronica foliosa*, *Veronica leptostachya*, *Veronica leucantha*, *Veronica mollis*, *Veronica paniculata*, *Veronica paniculata* subsp. *foliosa*, *Veronica ramosa*, *Veronica rubella*, *Veronica rubicunda*, *Veronica serrulata*, *Veronica spuria*, *V.* subsp. *foliosa*, *V.* var. *croatica*, *Veronica stephaniana*, *Veronica sublaciniata*, *Veronica triquetra*, *Veronica upsaliensis*, *Veronica verbenae*, *Veronica virgata*, *Veronicastrum incisum*, *Veronicastrum laciniatum*

čeleď: Scrophulariaceae

oblasti: Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, J Ural, Maďarsko, Německo, New Hampshire, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Ťan-šan, Ukrajina, Vermont, Z Rusko

Roste v Německu, Čechách a Moravě, Slovensku, Rakousku, Maďarsku, Ukrajině, Rumunsku, Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,5 - 1,2m. Listy jsou seskupeny do 3 - 4četných přeslenů, jsou kopinaté až vejčité, špičaté, na bázi klínovité a řapíky jsou dlouhé 2 - 4 (i 5)mm. Lodyha je od báze ochlupená. Na vrcholu lodyhy vytváří vícehlavý 15cm hrozen z fialových květů, kališní cípy jsou tupé až zakulacené, zpravidla vyduté, na okraji krátce ochlupené, listeny jsou malé a čárkovité až vejčité. Plodem je tobolka. Patří mezi chráněné druhy C1. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *foliosum* (Rozrazil latnatý širolistý)
- subsp. *spurium* (Rozrazil latnatý pravý) - evropské Rusko, Ukrajina; užší kopinaté listy

Vyhovují mu suché, občas i vlhké půdy.

<https://www.rostliny.net/>