

Hypericum androsaemum (Třezalka bobulovitá)

čeleď: Hypericaceae

oblasti: Afrika, Andalusie, Austrálie, Britská Kolumbie, Gruzie, Írán, Irsko, Itálie, Kalifornie, Katalánsko, Kavkaz, Malá Asie (Anatolie), Nový Zéland, Oregon, Středozeří, Švýcarsko, Washington

Roste v jižní Evropě, podél Atlantiku až po Irsko, dále ve středozeří, severní Africe, Turecku a Íránu v podobě 1/2opadavého keře a zavlečená byla do Austrálie a na Nový Zéland. Dorůstá výšky 0,3 - 0,7 (i 1)m a mírně větší šířky. Větve jsou vystoupavé. Listy jsou přisedlé, vejčitě kopinaté až vejčité, průsvitně tečkované, žláznaté, zelené, na okraji načervenalé, dlouhé (5 -) 7,5 - 10 (i 15)cm, široké 4 - 8,5cm a na spodní straně bělavé. Květenství je vrcholové, 1 - 9tikvěté, vlastní květy jsou žluté, kališní lístky nestejně, široké 2,5cm, dlouhé 0,4 - 1,2cm a korunní lístky jsou dlouhé 0,4 - 1cm. Plodem je červená až černá eliptická bobule průměru 0,8 - 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Albury Purple'

- 'Aureum'

<div>Vyhovují jí kyselé hlinité půdy dobře propustné vlhké bohaté na živiny na plném slunci.</div>

<https://www.rostliny.net/>