

Hypericum perforatum (Třezalka tečkovaná)

čeleď: Hypericaceae

oblasti: Andalusie, Arkansas, Austrálie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Havajské ostrovy, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Krym, Louisiana, Maine, Malá Asie (Anatolie), Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, S Afrika, Severní Dakota, Severní Karolína, Sibiř, SZ Čína, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Ukrajina, Uttarákhend, Vermont, Virginie, Wisconsin, Wyoming, Z Čína, Západní Virginie

Roste od Evropy po východní Asii, Ameriku, Australasii a severní Afriku jako trvalka. Dorůstá výšky 0,3 - 0,6 (i 1,1)m. Listy jsou přisedlé, vstřícné, vejčité až čárkovité nebo obkopinaté, zašpičatělé až zakulacené, dlouhé (0,5 -) 1,6 - 2,5 (i 3,5)cm, široké (0,2 -) 0,5 - 0,7 (i 1,4)cm a báze je uťatá až zakulacená. Květenstvím je (1 -) 5 až mnohokvětá kuželovitá lata, vlastní květy jsou žluté průměru 1,5 - 2,5cm, kališní lístky jsou kopinaté, podlouhlé nebo eliptické, špičaté až zašpičatělé, dlouhé (3 -) 4 - 6 (i 8)mm, korunní lístky jsou úzce obkopinaté, dlouhé (0,8 -) 1 - 1,4 (i 1,8)cm a proti slunci jsou vidět tečky. Plodem je vejčitá až kuželovitá tobolka délky (4 -) 5 - 9mm a obsahuje semena délky 0,8 - 1 (i 1,2)mm. Při poranění může ronit červenou tekutinu. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. angustifolium
- subsp. chinense
- subsp. perforatum (Třezalka tečkovaná pravá)
- subsp. songaricum
- subsp. veronense

Vyhovuje ji plné slunce a sušší půda ve smíšených nebo jehličnatých lesích, mýtiny, trávníky s chudší půdou, skály, okraje cest, atp.

<https://www.rostliny.net/>