

# Lychnis (Kohoutek)

čeleď: Caryophyllaceae

Roste v mírném pásu Evropy, Asie a severní Afriky. Kvete bílými, růžovými oranžovými nebo červenými 5tičetnými květy s pakorunkou a často s vykrojenými 2laločnými nebo třepenými korunními lístky. Plodem je tobolka.

Vyhovuje mu plné slunce a propustná půda.

Množí se semeny nebo dělením.

## Lychnis alpina (Kohoutek alpský)

oblasti: Katalánsko, Německo

Roste v horách severní polokoule a v arktických oblastech jako trvalka. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Listy vytvářejí přízemní růžici a jsou tmavě zelené. Kvete růžovými květy s 2dílnými korunními lístky a pakorunkou. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Rosea' - výška 10cm

## Lychnis arkwrightii

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Vesuvius' - výška 70cm, oranžovočervené květy

## Lychnis chalcedonica (Kohoutek plamenný)

oblasti: Alberta, Aljaška, Connecticut, Česká republika, Idaho, Illinois, Indiana, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Saskatchewan, Severní Dakota, Vermont, Wisconsin

Roste v Evropě jako trvalka. Dorůstá výšky 0,5 - 0,7 (i 1,3)m. Lodyha i s listy je drsně chlupatá. Kvete červeně oranžovými květy ve staženém vidlanu. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Carneum' - výška 80cm; květy růžové

Potřebuje plné slunce. Lepší je dopřát rostlině nějakou oporu.

## Lychnis coeli-rosa

## Lychnis cognata

Kvete oranžovými květy.

## Lychnis coriacea

synonyma: Coronaria coriacea

## Lychnis coronaria (Kohoutek věncový)

oblasti: Alabama, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Írán, Itálie, J Rusko, Jižní Karolína, Kalifornie, Kašmír, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Slovensko, SZ Afrika, Tennessee, Turkestán, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v jižní, střední a jihovýchodní Evropě, jižním Rusku, severozápadní Africe, Íránu, Turkestánu a Kašmíru v podobě krátkověké trsnaté trvalky. Dorůstá výšky 50 - 60 (i 90)cm a šířky 45cm. Lodyhy a listy jsou stříbřitě plstnaté. Listy vytváří přizemní růžici, jsou přisedlé, kopinaté až obkopinaté, dlouhé 2 - 9cm a široké 1,5 - 2,5cm. Květenstvím je lata nebo vidlan, vlastní květy jsou ploché, 5tičetné, růžově červené, průměru 3cm, kalich je ochlupený a dlouhý 1,8 - 2cm. Po odkvětu odumírá. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba' - výška 70cm; květy bílé
- 'Garden's World'
- 'Oculata' - výška 70cm; květy bílé s růžovým středem

Roste na louce i ve spárách na plném slunci. Dobře snáší sucho. Nemá rád stín a chladno.

Množí se semeny.

## Lychnis coronata

## Lychnis flos-cuculi (Kohoutek luční)

oblasti: Alpy, Connecticut, Česká republika, Irsko, Itálie, Katalánsko, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Montana, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rakousko, Rhode Island, Severní Karolína, Sibiř, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin

Pochází z Evropy a Sibiře. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,2 - 0,9 (i 1)m. Listy mají dlouhý řapíkatý tvar a vyrůstají na lodyze velmi řídce. Květy seskupené do vidlanu můžou nabývat barvy růžové, červené nebo bílé. Okvětní lístky jsou rozdělené na 4 laloky. Plodem je tobolka.

Vyhovují mu vlhčí půdy bohaté na živiny.

## Lychnis flos-jovis (Kohoutek Jovišův)

oblasti: Itálie, Z Alpy

Roste v západních Alpách. Dorůstá výšky 30 - 45 (i 80)cm. Povrch je drobně bíle ochlupený. Listy vytváří přizemní růžici, jsou podlouhlé, plstnaté a řapíkaté. Kvete růžovými krátce stopkatými květy seskupenými do chocholíkově staženého vidlanu s 2laločnými korunními lístky. Plodem je tobolka.

## Lychnis fulgens

oblasti: Pennsylvania

## Lychnis miqueliana

## Lychnis nivalis

## Lychnis senno

## Lychnis sibirica

## Lychnis sieboldii

## Lychnis viscaria (Kohoutek smolníčka)

synonyma: *Steris viscaria*, *Viscaria viscosa*, *Viscaria vulgaris*

oblasti: Česká republika, JV Evropa, Maine, Massachusetts, Německo, New Hampshire, New York, Ohio, Pennsylvania, Ukrajina, V Karpaty, Wisconsin

Roste v jihovýchodní Evropě a západní Asii jako trvalka. Dorůstá výšky 20 - 50 (i 75)cm a šířky 45cm. Stonky jsou vzpřímené, hnědě červené, s lepkavými místy, zejména pod uzlinami. Listy jsou vstřícné, přisedlé, čárkovité až podlouhlé a zašpičatělé. Kvete růžovými až růžově červenými nebo červeně fialovými trubkovitými květy v latovitém květenství. Plodem je 5tipouzdrá tobolka. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Alba' - květy bílé
- 'Plena' - výška 40cm; květy červeně růžové
- 'Schnee' - výška 50cm; květy bílé
- 'Splendens' - výška 40cm; květy růžové
- 'Splendens Plena'/'Flore Pleno' - květy plnokvěté, růžově červené, větší

Vyhovují jí suchá místa v mírně kyselější písčité půdě a plné slunce nebo polostín.

## Lychnis wilfordii

## Lychnis x haageana

Kříženec *L. fulgens* a *L. sieboldii*. Roste v podobě krátkověké trvalky. Dorůstá výšky 45cm. Listy vytvářejí přízemní růžici a jsou tmavě zelené. Květy jsou růžové až růžově červené. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Vesuvius' - listy tmavě zelené, s bronzovým nádechem; květy oranžové

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K89.php>

<http://botany.cz/cs/lychnis-viscaria/>

[http://hobby.idnes.cz/smolnicka-obecna-lychnis-viscaria-drr-/herbar.asp?c=A081031\\_132814\\_herbar\\_lud](http://hobby.idnes.cz/smolnicka-obecna-lychnis-viscaria-drr-/herbar.asp?c=A081031_132814_herbar_lud)

<http://www.garten.cz/a/cz/4056-lychnis-chalcedonica-kohoutek-chalcedonsky/>

<https://www.rostliny.net/>