

## Asparagus racemosus (Chřes čtyřhranný)

synonyma: *Asparagopsis abyssinica*, *Asparagopsis acerosa*, *Asparagopsis brownei*, *Asparagopsis decaisnei*, *Asparagopsis hohenackeri*, *Asparagopsis javanica*, *Asparagopsis retrofracta*, *Asparagopsis subquadrangularis*, *Asparagus dubius*, *Asparagus jacquemontii*, *Asparagus penduliflorus*, *Asparagus petitianus*, *A. var. javanicus*, *A. var. longicladodius*, *A. var. subacerosus*, *A. var. tetragonus*, *A. var. zeylanicus*, *Asparagus stachyoides*, *Asparagus tetragonus*, *Asparagus zeylanicus*, *Protasparagus jacquemontii*, *Protasparagus racemosus*, *Protasparagus racemosus var. javanicus*, *Protasparagus racemosus var. subacerosus*, *Protasparagus zeylanicus*

čeleď: Asparagaceae

oblasti: Afrika, Austrálie, Bhútán, Kašmír, Malajsie, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, Sikkim, Srí Lanka

Roste v Austrálii, Malajsii, Myanmaru, Indii, Bhútánu, Nepálu, Kašmíru, Pakistánu a Africe v podobě šplhající trvalky nebo polokeře. Větve jsou mírně 4hranné. Listy mají ostré ostruhy délky 1,5 - 2cm na hlavním stonku a na větvích jsou kratší, dlouhé 0,5 - 1cm. Fylokádia vyrůstají po 3 - 5 (i 8)ks, jsou čárkovitá, dlouhá 1 - 2cm a široká 0,5mm. Květenstvím je bohatý hrozen nebo lata délky do 8cm, vlastní květy jsou oboupohlavné, mají 3 - 4mm stopku, korunní lístky jsou bílé, dlouhé 8mm a široké 1,5mm. Kořeny lze konzumovat.

<https://www.rostliny.net/>