

Annona muricata (Anona ostnitá)

synonyma: *Annona bonplandiana*, *Annona cearaensis*, *Annona macrocarpa*, *A. f. mirabilis*, *A. var. borinquensis*, *Guanabanus muricatus*

čeleď: Annonaceae

oblasti: Pákistán, Portoriko, S Jižní Amerika

Roste v Karibiku a na severu Jižní Ameriky v podobě stálezeleného dvoudomého stromu s nízko větvenou korunou a vzpřímenými postranními větvemi. Dorůstá výšky (4 -) 4,5 - 6 (i 10)m. Listy jsou střídavé, kožovité, lesklé, tmavězelené, obvejčité, celokrajné, v mládí ochlupené, dlouhé 8 - 16 (i 20)cm, široké 3,1 - 6,8cm a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Kvete oboupohlavnými žlutými až nazelenalými květy přímo na kmeni po 2 i více ks, jejich velikost dosahuje 5cm a je tvořen 3rohými korunními lístky. Souplodí je hruškovité, zelené až nahnědlé, pokryté pravidelně posázenými výrůstky ve tvaru ostnu umístěnými v jemě vymodelovaném kosočtverci, velikost může dosáhnout 35cm délky, 20cm průměru, hmotnosti i 6kg, dužina je jedlá, chutná, sladkokyselá, krémová, obsahuje černá semena velikosti 1 - 2cm, které jsou ale jedovaté, nesmí se konzumovat a v jediném plodu jich může být až 170ks. Dokáže plodit v průběhu celého roku.

Roste v tropickém prostředí a hluboké půdě s bohatou zálivkou na jaře a na podzim. Zimujeme ideálně při teplotě 15°C při dostatku světla.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>