

Festuca ovina (Kostřava ovčí)

synonyma: *Avena ovina*, *Bromus ovinus*, *Festuca agrestis*, *Festuca amethystina* var. *asperrima*, *Festuca baumgarteniana*, *Festuca calligera*, *Festuca centroapenninica*, *Festuca chiisanensis*, *Festuca curvifolia*, *Festuca duriuscula* var. *alpina*, *Festuca duriuscula* var. *gracilior*, *Festuca duriuscula* var. *pubescens*, *Festuca filifolia*, *Festuca fontqueriana*, *Festuca glauca* var. *exilior*, *Festuca glauca* var. *firmuloides*, *Festuca glauca* var. *hallerioides*, *Festuca glauca* var. *scabrifolia*, *Festuca glaucantha*, *Festuca glaucoidea*, *Festuca guestphalica*, *Festuca hallerioides*, *Festuca indigesta* subsp. *curvifolia*, *Festuca jumpeiana*, *Festuca laevis* var. *ruprechtii*, *Festuca lasiantha*, *Festuca livida*, *Festuca malzevii*, *Festuca malzewii*, *Festuca mariettana*, *Festuca maskerensis*, *Festuca nigra*, *Festuca oligosantha*, *F. f. aculeolata*, *F. f. exilior*, *F. f. firmuloides*, *F. f. glaucoides*, *F. f. hispidula*, *F. f. nitida*, *F. f. submucronata*, *F. subsp. bigoudenensis*, *F. subsp. calligera*, *F. subsp. coreana*, *F. subsp. elata*, *F. subsp. firmulacea*, *F. subsp. guestphalica*, *F. subsp. kandavanica*, *F. subsp. litoralis*, *F. subsp. nipponica*, *F. subsp. ruprechtii*, *F. subsp. sphagnicola*, *F. subsp. sytschuanica*, *F. subsp. vylzaniae*, *F. var. alpina*, *F. var. angustifolia*, *F. var. calligera*, *F. var. centroapenninica*, *F. var. chiisanensis*, *F. var. chosenica*, *F. var. coreana*, *F. var. elata*, *F. var. firmulacea*, *F. var. fissa*, *F. var. fontqueriana*, *F. var. glaucofirmula*, *F. var. glaucoidea*, *F. var. hibernica*, *F. var. jumpeiana*, *F. var. juncifolia*, *F. var. kandavanica*, *F. var. koreanoalpina*, *F. var. laevifolia*, *F. var. litoralis*, *F. var. livida*, *F. var. malzevii*, *F. var. malzewii*, *F. var. marchandii*, *F. var. maroccana*, *F. var. maskerensis*, *F. var. nipponica*, *F. var. paniciana*, *F. var. pubiculmis*, *F. var. purpusiana*, *F. var. ruprechtii*, *F. var. ruscinonensis*, *F. var. senneniana*, *F. var. sulcifera*, *F. var. tateyamensis*, *F. var. vulgaris*, *F. var. weileri*, *F. var. yarochenkoi*, *Festuca pauciflora*, *Festuca pietrosii*, *Festuca pumila*, *Festuca purpusiana*, *Festuca ruprechtii*, *Festuca sauvagei*, *Festuca saximontana* subsp. *purpusiana*, *Festuca saximontana* var. *purpusiana*, *Festuca sciaphila*, *Festuca sphagnicola*, *Festuca trachyphylla* f. *firmulacea*, *Festuca valesiaca* var. *lasiantha*, *Festuca verguinii*, *Festuca vorobievii*, *Festuca vulgaris*, *Festuca weileri*, *Festuca yarochenkoi*, *Gnomonia ovina*

čeleď: Poaceae

oblasti: Connecticut, Česká republika, Delaware, Illinois, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Karolína, JV Čína, Kalifornie, Katalánsko, Maine, Massachusetts, Missouri, Německo, New Hampshire, Oregon, Polsko, Rhode Island, Švýcarsko, Tchaj-wan, Utah, Vermont, Washington

Roste chladnějších místech mírného pásma v hustých trsech. Dorůstá výšky (15 -) 20 - 30 (i 60)cm. Listové pochvy jsou srostlé u báze (max. do 1/3), vlastní listy jsou tuhé, úzké, zelené až sivé. Květenstvím je lata délky (4 -) 5 - 12cm se 3 - 8mikvěty klásky. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *djurdjurae*
- subsp. *gracilior*
- subsp. *guestfolica* (Kostřava ovčí vestfálská) - listy průmru 0,5 - 0,9mm; plucha má (bez osiny) délku (3,2 -) 3,6 - 4,2 (i 4,5)mm
- f. *hispidula*
- subsp. *molineri*
- var. *novae-zelandiae*/F. *novae-zelandiae* - listy úzké, dlouhé 45cm; 5 - 7mikvěté klásky
- subsp. *ovina* (Kostřava ovčí pravá) - listy průměru 0,3 - 0,7mm; plucha má (bez osiny) délku 3 - 3,8 (i 4,2)mm
- subsp. *valentina*
- 'Vivipara'

Vyhovují jí kyselé půdy, světlé lesy, okraje, písčiny a pastviny.

<https://www.rostliny.net/>