

Festuca ovina (Kostřava ovčí)

synonyma: *Avena ovina*, *Bromus ovinus*, *Festuca agrestis*, *Festuca amethystina* var. *asperrima*, *Festuca baumgarteniana*, *Festuca calligera*, *Festuca centroapenninica*, *Festuca chiisanensis*, *Festuca curvifolia*, *Festuca duriuscula* var. *alpina*, *Festuca duriuscula* var. *gracilior*, *Festuca duriuscula* var. *pubescens*, *Festuca filifolia*, *Festuca fontqueriana*, *Festuca glauca* var. *exilior*, *Festuca glauca* var. *firmuloides*, *Festuca glauca* var. *hallerioides*, *Festuca glauca* var. *scabrifolia*, *Festuca glaucantha*, *Festuca glaucoidea*, *Festuca guestphalica*, *Festuca hallerioides*, *Festuca indigesta* subsp. *curvifolia*, *Festuca jumpeiana*, *Festuca laevis* var. *ruprechtii*, *Festuca lasiantha*, *Festuca livida*, *Festuca malzevii*, *Festuca malzewii*, *Festuca mariettana*, *Festuca maskerensis*, *Festuca nigra*, *Festuca oligosantha*, F. f. *aculeolata*, F. f. *exilior*, F. f. *firmuloides*, F. f. *glaucoidea*, F. f. *hispidula*, F. f. *nitida*, F. f. *submucronata*, F. subsp. *bigoudenensis*, F. subsp. *calligera*, F. subsp. *coreana*, F. subsp. *elata*, F. subsp. *firmulacea*, F. subsp. *guestphalica*, F. subsp. *kandavanica*, F. subsp. *litoralis*, F. subsp. *nipponica*, F. subsp. *ruprechtii*, F. subsp. *sphagnicola*, F. subsp. *sytschuanica*, F. subsp. *vylzaniae*, F. var. *alpina*, F. var. *angustifolia*, F. var. *calligera*, F. var. *centroapenninica*, F. var. *chiisanensis*, F. var. *chosenica*, F. var. *coreana*, F. var. *elata*, F. var. *firmulacea*, F. var. *fissa*, F. var. *fontqueriana*, F. var. *glaucofirmula*, F. var. *glaucoidea*, F. var. *hibernica*, F. var. *jumpeiana*, F. var. *juncifolia*, F. var. *kandavanica*, F. var. *koreanoalpina*, F. var. *laevifolia*, F. var. *litoralis*, F. var. *livida*, F. var. *malzevii*, F. var. *malzewii*, F. var. *marchandii*, F. var. *maroccana*, F. var. *maskerensis*, F. var. *nipponica*, F. var. *paniciana*, F. var. *pubiculmis*, F. var. *purpusiana*, F. var. *ruprechtii*, F. var. *ruscinonensis*, F. var. *senneniana*, F. var. *sulcifera*, F. var. *tateyamensis*, F. var. *vulgaris*, F. var. *weileri*, F. var. *yarochenkoi*, *Festuca pauciflora*, *Festuca pietrosii*, *Festuca pumila*, *Festuca purpusiana*, *Festuca ruprechtii*, *Festuca sauvagei*, *Festuca saximontana* subsp. *purpusiana*, *Festuca saximontana* var. *purpusiana*, *Festuca sciaphila*, *Festuca sphagnicola*, *Festuca trachyphylla* f. *firmulacea*, *Festuca valesiaca* var. *lasiantha*, *Festuca verguinii*, *Festuca vorobievii*, *Festuca vulgaris*, *Festuca weileri*, *Festuca yarochenkoi*, *Gnomonia ovina*

čeleď: Poaceae

oblasti: Connecticut, Česká republika, Delaware, Illinois, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Maine, Massachusetts, Missouri, Německo, New Hampshire, Oregon, Polsko, Rhode Island, Švýcarsko, Tchaj-wan, Utah, Vermont, Washington

Roste chladnějších místech mírného pásma v hustých trsech. Dorůstá výšky (15 -) 20 - 30 (i 60)cm. Listové pochvy jsou srostlé u báze (max. do 1/3), vlastní listy jsou tuhé, úzké, zelené až sivé. Květenstvím je lata délky (4 -) 5 - 12cm se 3 - 8mikvěty klásky. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *djurdjurae*
- subsp. *gracilior*
- subsp. *guestfolica* (Kostřava ovčí vestfálská) - listy průmru 0,5 - 0,9mm; plucha má (bez osiny) délku (3,2 -) 3,6 - 4,2 (i 4,5)mm
- f. *hispidula*
- subsp. *molineri*
- var. *novae-zelandiae*/F. *novae-zelandiae* - listy úzké, dlouhé 45cm; 5 - 7mikvěté klásky
- subsp. *ovina* (Kostřava ovčí pravá) - listy průměru 0,3 - 0,7mm; plucha má (bez osiny) délku 3 - 3,8 (i 4,2)mm
- subsp. *valentina*
- 'Vivipara'

Vyhovují jí kyselé půdy, světlé lesy, okraje, písčiny a pastviny.

<https://www.rostliny.net/>