

Impatiens balsamina (Netýkavka balzamína)

synonyma: *Balsamina angustifolia*, *Balsamina balsamina*, *Balsamina coccinea*, *Balsamina cornuta*, *Balsamina foeminea*, *Balsamina hortensis*, *Balsamina lacca*, *Balsamina minutiflora*, *Balsamina mollis*, *Balsamina odorata*, *Balsamina racemosa*, *Balsamina salicifolia*, *I. var. coccinea*, *I. var. corymbosa*, *I. var. longifolia*, *Impatiens coccinea*, *Impatiens cornuta*, *Impatiens eriocarpa*, *Impatiens giorgii*, *Impatiens malayensis*, *Impatiens salicifolia*, *Impatiens sinensis*, *Impatiens stapfiana*, *Impatiens tamsiana*

čeleď: *Balsaminaceae*

oblasti: Alabama, Čína, Florida, Illinois, Indiana, Indie, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Malajsie, Malajský poloostrov, Michigan, Missouri, New York, Ohio, Pákistán, Pennsylvania, Portoriko, Rhode Island, Severní Karolína, Srí Lanka, Turecko, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v Indii, Pákistánu, Srí Lance, Malajsii a Číně jako jednoletka, zavlečená byla do Turecka, jižní Evropy a Ameriky. Dorůstá výšky (25 -) 30 - 45 (i 60)cm a šířky 20 - 25cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou střídavé, úzce eliptické až kopinaté, zubaté, zelené, dlouhé 3 - 9cm a široké 1 - 3cm. Kvete po 1 - 2 (i 3)ks sytě červenými až fialovými (vzácně bílými či skvrnitými) květy s ostruhou o délce do 2,5 - 3cm na 1 - 5mm stopce a kališní lístky jsou dlouhé do 2cm. Plodem je až 1,5cm dlouhá ochlupená tobolka s 6 - 12ti kulovitými semeny.

Vyhovuje jí plné slunce i polostín. Půda by měla být výživná a vlhká.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>