

## Cuphea (Hlazenec)

čeleď: Lythraceae

Roste v tropech Ameriky v podobě 1/2dřevitých keřů. Nevyšší druhy dorůstají do 2m. Listy jsou zpravidla vstřícné. Kvete téměř celý rok dlouze trubkovými samostatnými květy anebo v hroznech, korunní lístky jsou červené, růžové anebo bílé.

Vyhovuje mu vlhká dobře propustná půda, plné slunce anebo polostín.

Množí se semeny nebo vrcholovými řízky.

### Cuphea aequipetala

#### Cuphea aspera

oblasti: Florida

#### Cuphea carthagagenensis

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi, Severní Karolína, Tennessee, Texas

#### Cuphea cyanea

#### Cuphea decandra

#### Cuphea epilobiifolia

#### Cuphea glutinosa

oblasti: Louisiana, Texas

#### Cuphea hookeriana

#### Cuphea hyssopifolia (Hlazenec yzopolistý)

oblasti: Guatemala, Havajské ostrovy, Honduras, Mexiko, Portoriko

Roste v Mexiku, Guatemale a Hondurasu v podobě krátkověkého keře. Dorůstá výšky do 50 (i 60)cm a šířky 90cm (u nás bývá výška jen 11 - 20cm). Listy jsou tmavězelené a vejčité. Kvete v paždí listů drobnými květy, trubka je krátká, korunní lístky jsou růžové až červenofialové.

Snáší i zastíněná místa.

Množí se semeny.

### Cuphea ignea (Hlazenc ohnivý)

oblasti: Havajské ostrovy, Karibik, Mexiko, Nikaragua

Roste v Mexiku a Karibiku v podobě 1/2keře. Dorůstá výšky 30 - 40 (i 60)cm. Listy jsou vstřícné, vejčité, tmavězelené, krátce řapíkaté, dlouhé 6cm a široké 2cm. Květy jsou červené, trubkovité, s černobílým okrajem a průměrem 3cm. Existuje i odrůda s bílými květy. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Tiny Mice' - červené květy s rozšířeným koncem

Pro zvýšení kvetení je vhodné rostlinu zaštípat. Potřebuje plné slunce (při parném dni raději přistínit), bohatou zálivku v létě (na zimu zmírňujeme), pokojovou teplotu 20 - 25°C, v zimě 15 - 18°C (minimum je 7 - 10°C). Hnojíme minerálními hnojivy. Přesazuje se jednou za 2 - 3 roky.

Množí se polodřevnatými řízkami nebo semeny.

### Cuphea ingrata

### Cuphea jorullensis

### Cuphea koehneana

### Cuphea laminuligera

### Cuphea lanceolata

### Cuphea linarioides

### Cuphea llavea

### Cuphea lutea

### Cuphea lutescens

### Cuphea melvilla

synonyma: C. speciosa

## Cuphea mesostemon

### Cuphea micrantha

oblasti: Portoriko

### Cuphea micropetala

oblasti: Mexiko

Roste v Mexiku. Listy jsou zelené, dlouhé do 6cm a mají nápadnou centrální žilku. Kvete trubkovitými květy ve 2 řadách, jsou žluté až červenooranžové, dlouhé 3,5 - 5cm, kalich je červený, nazlátý a špičky žlutozelené.

Vyhovují ji okraje potoků nebo vlhká půda.

### Cuphea miniata

Kvete dlouze trubkovými květy. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Purpurea' - výška 50cm, červenobílé květy

Množí se semeny.

### Cuphea nudicostata

### Cuphea painteri

### Cuphea parsonisia

oblasti: Portoriko

### Cuphea procumbens

oblasti: Georgia, Jižní Karolína, Massachusetts, Severní Karolína

Roste jako jednoletka.

### Cuphea salvadorensis

### Cuphea strigulosa

oblasti: Florida, Portoriko

### Cuphea subuligera

### Cuphea viscosissima

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wyoming, Západní Virginie

### Cuphea wrightii

oblasti: Arizona, Nové Mexiko

### Cuphea x purpurea

Kříženec C. llavea a C. procumbens. Roste v podobě rozložitého 1/2keře. Dorůstá výšky 45cm. Listy vyrůstají ve 2 řadách, jsou vejčité a zašpičatělé. Květy jsou trubkovité, kalich má délku 2,5cm, fialová žebra, korunní lístky jsou 2 a jsou ouškovité. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Firefly' - květy červené

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/cherbar/heslo.php?176>

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K400.php>

<http://www.celysvet.cz/hlazenc-ohnivy-kufea.php>

<http://www.garten.cz/a/cz/3614-cuphea-ignea-hlazenc-ohnivy/>

<https://www.rostliny.net/>