

Schinus molle (Pepřovec balzámový)

synonyma: *Schinus angustifolia*, *Schinus angustifolius*, *Schinus bituminosus*, *Schinus huigan*, *Schinus huygan*, *S. var. argentifolius*, *S. var. huigan*, *S. var. huynan*, *Schinus occidentalis*

čeleď: Anacardiaceae

oblasti: Andalusie, Argentina, Austrálie, Čile, Ekvádor, Florida, Havajské ostrovy, J Afrika, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Maroko, Nový Zéland, Portoriko, Střední střeozemí, Texas, Uruguay

Roste ve střední a Jižní Americe v podobě dvoudomého stálezeleného stromu nebo keře s kulovitou řidší korunou a převislými větvemi. Dorůstá výšky 4 - 8 (i 15)m a šířky 10m v široce válcovitém až půlkulatém tvaru. Borka má červenohnědou barvu. Lichožpeřené tmavězelené listy vyrůstají střídavě, jsou převislé, dlouhé 8 - 25cm, tvoří je (11 -) 19 - 41 úzkých, (1,7 -) 3 - 5 (i 7)cm dlouhými, (3 -) 5 - 8mm širokých kožovitých kopinatých lístků s občas i pilovými okraji. Kvete drobnými nažloutlými oboupohlavnými i jednopohlavnými květy ve svislém latovitém květenství s délkou 10 - 20cm, kalich je kalíškovitý, má 5 kališních lístků délky 0,5mm, korunních lístků je 5, jsou bělavé a dlouhé 1,3 - 2mm. Plodem je kulovitá peckovice růžovočervené barvy s trochou dužiny o průměru (3 -) 5 - 7mm. Pro prasata a drůbež je jedovatá. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *areira*

Vyhovuje mu horská savana a suché.

<https://www.rostliny.net/>