

## Moringa oleifera (Moringa olejodárná)

čeleď: Moringaceae

oblasti: Balúčistán, Chajbar Paštúncwá, Florida, Indie, Paňdžáb (pakistánský), Portoriko, Sindh, Srí Lanka

Roste v Indii a Pákistánu v podhůří Himálaje v podobě opadavého stromu. Dorůstá výšky 10m. Povrch je v mládí ochlupený. Listy jsou střídavé, 2 - 3x zpeřené, dlouhé do 60cm, tvořené 5 - 11 primárními, 5 - 11 sekundárními, vlastní lístky jsou eliptické, zakulacené, světle zelené, dlouhé 1 - 1,75 (i 2,4)cm, široké 0,5 - 1,8cm, řapíčky jsou dlouhé 4 - 8mm a řapíky jsou dlouhé 4 - 15cm. Květenství je dlouhé 8 - 30cm, vlastní květy jsou bílé, průměru 2,5cm, na 1,3 - 2,1cm stopce, kalich má trubku ochlupenou, laloky mírně nestejně, čárkovité až kopinaté, dlouhé 1,3 - 1,5cm, široké 5 - 6mm, korunní lístky jsou lžičkovité, špičaté, žilkované, dlouhé 1,2 - 1,8cm a široké 5 - 6mm. Plodem je hnědá tobolka délky 30 - 45 (i 60)cm, šířky 2,5cm, s 9ti svislými žebry, po dozrání se na spodní straně rozevívá 3mi chlopněmi a obsahuje prakticky černá 3hranná zakuklacená okřídlená semínka, ze kterých se získává tzv. behenový olej.

<https://www.rostliny.net/>