

## Barleria prionitis

synonyma: *Barleria coriacea*, *Barleria echinata*, *B. subsp. madagascariensis*, *B. var. angustissima*, *B. var. pubescens*, *Barleria quadrispinosa*, *Barleria spicata*

čeleď: Acanthaceae

oblasti: Arabský poloostrov, Indie, J Afrika, JV Asie, Pákistán, Portoriko, V Afrika

Roste od jižní Afriky po Arabský poloostrov, dále přes Indii a Pákistán po jihovýchodní Asii v podobě bohatě větveného keře. Trny jsou dlouhé 1 - 2cm. Listy jsou eliptické až obvejčité, řídce ochlupené, dlouhé (4 -) 6 - 12 (i 17)cm, široké 2 - 5 (i 6)cm a řapíky jsou dlouhé max. 2,5cm. Květy jsou velké, žluté, dlouhé do 7cm, zpravidla samostatné nebo ve vrcholových klasech, listence jsou špičaté, dlouhé 1 - 2,5cm, široké 3 - 5mm, listeny jsou čárkovité, dlouhé 1 - 2cm, kalich má 4 ostnitě laloky, vnější 2 jsou široce obkopinaté, špičaté, dlouhé 1,5 - 1,7cm, vnitřní jsou úzce kopinaté, dlouhé 1 - 1,2cm, koruna má průměr 1,5cm, může být na vnější straně ochlupená a trubka je dlouhá 2 - 2,5cm. Plodem je tobolka délky 1,5 - 2cm, šířky 0,8 - 1cm a obsahuje 2 kulovitá přitiskle ochlupená semena délky 6mm a průměru 5mm.

<https://www.rostliny.net/>