

Ptychosperma

čeleď: Arecaceae

Jméno rodu odkazuje na vrásčitá semena pro rod typická. Centrem rozšíření je Nová Guinea a okolí včetně severu Austrálie a Šalamounových ostrovů. Celý rod má 28 druhů.

Ptychosperma ambiguum

synonyma: *Actinophloeus ambiguus*, *Drymophloeus ambiguus*, *Saguaster ambiguus*

Ptychosperma bleeseri

oblasti: Queensland, Severní teritorium

Pochází ze Severního teritoria a Queenslandu v Austrálii.

Ptychosperma buabe

Ptychosperma burretianum

Ptychosperma caryotoides

synonyma: *Actinophloeus montanus*, *Drymophloeus montanus*, *P. discolor*, *P. josephense*, *P. leptocladum*, *P. montanum*, *P. polyclados*, *P. ridleyi*, *P. sayeri*

Ptychosperma cuneatum

synonyma: *Actinophloeus cuneatus*, *P. tenue*

Ptychosperma elegans (Palma samotářská)

synonyma: *Actinophloeus capitis-yorki*, *Archontophoenix elegans*, *Archontophoenix jardinei*, *Archontophoenix veitchii*, *P. capitis-yorki*, *P. elegans* var. *sphaerocarpum*, *P. jardinei*, *P. seaforthii*, *P. wendlandianum*, *P. wendlandianum* var. *sphaerocarpum*, *Saguaster capitis-yorki*, *Saguaster elegans*, *Seaforthia elegans*

oblasti: Florida, Queensland

Pochází z Austrálie.

Ptychosperma furcatum

synonyma: *Actinophloeus furcatus*

Ptychosperma gracile

synonyma: *Saguaster gracilis*, *Seaforthia ptychosperma*

oblasti: Papua-Nová Guinea

Pochází z Papui Nové Guineje.

Ptychosperma hartmannii

Ptychosperma hentyi

oblasti: Papua-Nová Guinea

Pochází z Papui Nové Guineje.

Ptychosperma lauterbachii

synonyma: *Actinophloeus punctulatus*, *P. hollrungii*, *P. punctulatum*

Ptychosperma lineare

synonyma: *Actinophloeus linearis*

Ptychosperma macarthurii

synonyma: *Actinophloeus bleeseri*, *Actinophloeus hospitus*, *Actinophloeus macarthurii*,
Actinophloeus macarthurii var. *hospitus*, *Carpentaria bleeseri*, *Kentia macarthurii*, *P. bleeseri*, *P. hospitum*, *P. julianettii*, *Saguaster macarthurii*

oblasti: Florida, Queensland, Severní teritorium

Pochází ze Severního teritoria a Queenslandu v Austrálii.

Ptychosperma macrocerum

Ptychosperma mambare

synonyma: *Drymophloeus mambare*

Ptychosperma microcarpum

synonyma: *Actinophloeus macrospadix*, *Actinophloeus microcarpus*, *P. macrospadix*

Ptychosperma mooreanum

Ptychosperma nicolai

synonyma: *Actinophloeus nicolai*, *Romanovia nicolai*

Ptychosperma praemorsum

Ptychosperma propinquum

synonyma: *Actinophloeus propinquus*, *Drymophloeus propinquus*, *Drymophloeus propinquus* var. *keiensis*, *P. keiense*, *Sagaster propinquus*

Ptychosperma pullenii

Ptychosperma ramosissimum

Ptychosperma rosselense

Ptychosperma salomonense

synonyma: *P. kajewskii*, *P. multiramosum*, *P. pachycarpum*, *Strongylocaryum brassii*, *Strongylocaryum latius*, *Strongylocaryum macranthum*

Ptychosperma sanderianum

synonyma: *Actinophloeus sanderianus*, *Kentia sanderiana*

Ptychosperma schefferi

Ptychosperma streimannii

Ptychosperma tagulense

Ptychosperma vestitum

Ptychosperma waitianum

oblasti: Nová Guinea

Pochází ze zálivu Milne Bay na Nové Guineji. Je sotva do tří metrů vysoká a lístky mají nepravidelný tvar s hluboce půlměsíčitým okrajem a v mládí jsou krásně sytě červené. Je hojně pěstovaná jako okrasná. Zajímavostí jsou i tmavočervené květy.