

Semiarundinaria (Polorákosovec)

čeled': Poaceae

Existuje asi 20 druhů. Pochází z Japonska a jižní Asie. Délka listů se pohybuje do 20cm a má příčné žilkování.

Semiarundinaria densiflora

synonyma: *Arundinaria densiflora*, *Brachystachyum densiflorum*, *Brachystachyum densiflorum* var. *villosum*, *Fargesia densiflora*, *S. densiflora* f. *villosa*

Semiarundinaria fastuosa

synonyma: *Arundinaria fastuosa*, *Arundinaria narihira*, *Bambusa fastuosa*, *Phyllostachys fastuosa*, *S. fastuosa*, *S. fastuosa* f. *viridis*, *S. fastuosa* var. *viridis*, *S. viridis*

oblasti: Čína, Japonsko

Pochází z teplých a subtropických oblastí Číny a Japonska. Dorůstá výšky 6 - 8 (i 10)m při průměru 2 - 4cm. Stébla jsou po celý rok zelená, na slunci se mohou barvit do červena. Z kolének vyrůstají 3 - 4 větvičky. Listy mají délku 10 - 15cm a šířku 2 - 2,5cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Viridis' - dorůstá výšky 10 - 12 (i 14)m, průměr stébel 3 - 4cm a na slunci hnědnou, odolává teplotám do -25°C.

Potřebuje chráněná místa. Odolává teplotám do -20°C.

Semiarundinaria fortis

synonyma: *S. fortis* f. *nebulosa*

Semiarundinaria kagamiana

synonyma: *Arundinaria fastuosa* var. *kagamiana*, *S. fastuosa* var. *kagamiana*

Semiarundinaria shapoensis

Semiarundinaria sinica

Semiarundinaria yashadake

synonyma: *Arundinaria fastuosa* var. *yashadake*, *S. fastuosa* var. *yashadake*

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Kimmei'

<https://www.rostliny.net/>