

Convolvulus althaeoides (Svlačec proskurníkový)

čeleď: Convolvulaceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Egypt, Francie, Itálie, Izrael, Jordánsko, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Maďarsko, Makaronésie, Maroko, Portugalsko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovinsko, Sýrie, Tunisko, Turecko

Pochází ve středozeší a na Kanárských ostrovech jako trvalka. Lodyha je plazivá nebo ovíjivá, na bázi zdřevnatělá, rýhovaná, ochlupená a dlouhá (0,2 -) 0,3 - 1 (i 2)m. Listy jsou střídavé, ochlupené, vejčité až srdčité, výrazně pilovité, dlouhé 7 (i 9)cm a s vyšší výškou se však vytvářejí laloky, které jsou na vrcholu velmi výrazné. Kvete po 2 - 3ks na dlouhých stopkách, kališní lístky jsou srostlé, cípy asymetrické, koruna je široce nálevkovitá, 5tičetná, růžová, v jícnu tmavší, průměru (2 -) 2,5 - 3 (i 4,5)cm a poupata jsou spirálovitě stočená. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. althaeoides (Svlačec proskurníkový pravý)
- subsp. tenuissimus

Vyhovují mu okraje cest, úhory, pole, atp.

Množí se podzemními oddenky.

<https://www.rostliny.net/>