

Epilobium ciliatum (Vrbovka žláznatá)

synonyma: Chamaenerion dominii, Epilobium aconcaguinum, Epilobium adenocaulon, Epilobium adenocaulon f. albiflorum, Epilobium adenocaulon f. apricum, Epilobium adenocaulon f. umbrosum, Epilobium adenocaulon subsp. americanum, Epilobium adenocaulon subsp. rubescens, Epilobium adenocaulon var. ecomosum, Epilobium adenocaulon var. holosericeum, Epilobium adenocaulon var. parishii, Epilobium adenocaulon var. pseudocoloratum, Epilobium adenoclodon, Epilobium affine, Epilobium alaskae, Epilobium albiflorum, Epilobium americanum, Epilobium argentium, Epilobium brevistylum, Epilobium brevistylum var. subfalcatum, Epilobium brevistylum var. tenue, Epilobium brevistylum var. ursinum, Epilobium caesiovirens, Epilobium californicum, Epilobium californicum var. holosericeum, Epilobium californicum var. parishii, Epilobium chilense, Epilobium chilense f. latifolium, Epilobium chilense f. macrum, Epilobium chilense f. verticillatum, Epilobium chilense var. latifolia, Epilobium chilense var. latifolium, Epilobium chilense var. macra, Epilobium chilense var. macrum, Epilobium chilense var. valdiviense, Epilobium chilense var. verticillata, E. var. ecomosum, Epilobium ciliense var. valdiviense, Epilobium constrictum, Epilobium cunninghamii, Epilobium delicatum, Epilobium deminutum, Epilobium dominii, Epilobium fendleri, Epilobium glandulosum subsp. maximowiczii, Epilobium glandulosum var. adenocaulon, Epilobium glandulosum var. kurilense, Epilobium griseum, Epilobium holosericeum, Epilobium hookerianum, Epilobium kurilense, Epilobium leiophyton, Epilobium longipes, Epilobium macdougalii, Epilobium magellanicum, Epilobium maximowiczii, Epilobium novomexicanum, Epilobium ovatum, Epilobium parishii, Epilobium pedicellare var. latifolium, Epilobium perplexans, Epilobium praecox, Epilobium pseudolineare, Epilobium punctatum, Epilobium rubescens, Epilobium santa-cruzense, Epilobium santa-cruzense var. cruzense, Epilobium ursinum, Epilobium ursinum var. subfalcatum, Epilobium valdiviense, Epilobium valdiviense f. elatius, Epilobium valdiviense f. simplex, Epilobium valdiviense var. alboffii, Epilobium watsonii var. parishii

čeleď: Onagraceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Arizona, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Irsko, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Pochází ze Severní Ameriky. Dorůstá výšky 15 - 150cm. Červenozelený stonek má čtvercový průřez a šikmo vystoupavá. Listy jsou úzce až dlouze kopinaté, krátce řapíkaté (2 - 5mm) s drobnými pilovitými výstupky na okraji. Kvete růžovými až růžovofialovými květy se 4mi 3 - 6mm dlouhými okvětními lístky.

Můžete ji nalézt prakticky všude mimo les.