

Epilobium hirsutum (Vrbovka chlupatá)

synonyma: Chamaenerion grandiflorum, Chamaenerion hirsutum, Epilobium amplexicaule, Epilobium aquaticum, Epilobium dubium, Epilobium foliosum, Epilobium grandiflorum, Epilobium himalense, E. f. alboroseum, E. f. minor, E. f. minus, E. var. laetum, E. var. sericeum, E. var. tomentosum, E. var. villosissimum, E. var. villosum, Epilobium incanum, Epilobium mirei, Epilobium nassirelinulci, Epilobium ramosum, Epilobium serratum, Epilobium tomentosum, Epilobium villosum

čeleď: Onagraceae

oblasti: Andalusie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Himálaj, Illinois, Indiana, Írán, Irsko, Itálie, Katalánsko, Kazachstán, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Švýcarsko, Vermont, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v teplejších částech Evropy, Asie a Afriky jako trvalka. Dorůstá do výšky (0,2 -) 0,9 - 1,4 (i 2,5)m. Lodyha je větvená, ve spodní části je hustě ochlupená. Listy jsou kopinaté, špičaté, zubaté, ochlupené, dlouhé (2 -) 3 - 12 (i 14)cm, široké 0,5 - 3 (i 4,5)cm a jsou poloobjímavé. Kvete červenorůžovými květy v řídkém 5 - 20tičetném vzpřímeném hroznu na 0,5 - 1,8cm stopce, kalich má délku 0,6 - 1,5cm, kališní lístky jsou zašpičatělé, ochlupené, dlouhé 0,6 - 1cm, široké 2 - 2,8mm, korunní lístky jsou 4, srdčité, dlouhé (0,6 -) 1 - 1,7 (i 2)cm a široké 0,6 - 1,4cm. Plodem je tobolka délky 3 - 8,5 (i 10)cm na 0,5 - 2cm stopce a obsahuje semena délky 0,8 - 1,2mm, šířky 0,4 - 0,58mm s chmýrem délky 5 - 7mm.

Vyhovují ji vlhké půdy, rákosiny, nebo mělké stojaté vody do hloubky 10cm.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>