

Epilobium angustifolium (Vrbovka úzkolistá)

synonyma: Chamaenerion angustifolium, Chamaenerion angustifolium f. leiostylum, Chamaenerion angustifolium f. pubescens, Chamaenerion angustifolium var. abbreviatum, Chamaenerion angustifolium var. album, Chamaenerion angustifolium var. canescens, Chamaenerion angustifolium var. spectabile, Chamaenerion denticulatum, Chamaenerion spicatum, Chamaenerion spicatum f. alba, Chamaerion angustifolium, Chamerion angustifolium, Chamerion angustifolium f. pleniflorum, Chamerion angustifolium var. canescens, E. f. albiflorum, E. f. spectabile, E. subsp. albiflorum, E. var. abbreviatum, E. var. canescens, E. var. macrophyllum, E. var. pleniflorum, Epilobium antonianum, Epilobium elatum, Epilobium gesneri, Epilobium gracile, Epilobium leiostylon, Epilobium macrocarpum, Epilobium persicifolium, Epilobium rubrum, Epilobium salicifolium, Epilobium spicatum, Epilobium spicatum f. albiflorum, Epilobium variabile, Epilobium verticillatum

čeleď: Onagraceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Andalusie, Arizona, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Grónsko, Himálaj, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, J Čína, Jižní Dakota, Kalifornie, Katalánsko, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Mexiko, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Tennessee, Turecko, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Roste cirkumboreálně jako trvalka, v Americe sahá díky Kordillerám až do Mexika. Dorůstá výšky (0,3 -) 0,5 - 1,4 (i 2,5)m. Lodyha je vzpřímená, může být i ochlupená. Listy jsou střídavé, dlouze kopinaté s krátkými řapíky a na spodní straně mají výraznou žilnatinu, délku (2,5 -) 6 - 16 (i 20)cm a šířku (0,4 -) 1 - 2,5 (i 3,5)cm. Kvete růžovými, nebo i mírně načervenalými (i bílými) květy na 0,7 - 1,2cm stopce v dlouhém 20 - 50tičetném hroznu na konci lodyhy, kališní lístky jsou špičaté, dlouhé 0,9 - 1,3cm, široké 1,6 - 2mm, korunní lístky mají délku (1 -) 1,2 - 1,5 (i 2)cm a šířky 7 - 8mm. Plodem je tobolka délky (2,5 -) 4 - 7cm na 0,7 - 1,5cm stopce a obsahuje semena délky 1 - 1,3mm, šířky 0,4mm s bílým chmýrem délky 0,9 - 1,2cm.

Roste na pasekách, okrajích lesů nebo haldách s nejlépe dusíkatou půdou. Pokud přímo ve vodě, tak v hloubce 0 - 10cm. Využívá se v léčitelství.

Dobře se rozrůstá kořenovými výběžky a semeny.

<https://www.rostliny.net/>